



KNOWLEDGE
TRANSFER


ফসল নির্দেশিকা টমেটো

• জমি প্রস্তুতি

- » সরু নালা, সেচ ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- » মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ এবং আগাছা বৃদ্ধিকে হ্রাস করার জন্য জৈব বা প্লাস্টিক মালচ স্থাপন করা যেতে পারে।
- » চারা রোপণের ৮-১০ দিন পর মাচা স্থাপন করুন
- » প্রতি হেক্টরে ২৬,৬০০ চারা (ফসলের জাত এবং মৌসুমের সাথে সমন্বয় করে)




বাংলা



• চারা উৎপাদন


- ◆ মিশ্রণ তৈরি: ১০ মিনিট ধরে তাপ দিন অথবা আধা দিনের জন্য পুরো রোদে রাখুন; অতঃপর ঝেঁ পূরণ করুন




- ◆ বীজ বপন করুন এবং চারার সুরক্ষা দিন




- ◆ সার্বক্ষণিক আর্দ্রতা বজায় রাখুন



- ◆ পানি দেয়া কমিয়ে দিন এবং শেষ বিকেলে চারা রোপণের ৫-৭ দিন পূর্বে অধিক সূর্যালোকে রাখুন



• সার প্রয়োগ




প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা ২৬,৬০০ এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে
মৌসুম, মাটির অবস্থা এবং গাছের বৃদ্ধির ধরন অনুসারে সার প্রয়োগ সমন্বয় করুন

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা



- » পোকা-মাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আঠালো ফাঁদ (হলুদ এবং নীল) ব্যবহার করুন
- » ফলের মাছি পোকা দমনে মিষ্টি ফাঁদ, তুলসী পাতার নির্যাস কিংবা ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন



সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে অসুস্থ চারা,
পুরনো শস্য এবং আগাছা অবশ্যই তুলে ফেলুন
এবং ধ্বংস করুন



শস্যচক্র পোকামাকড় এবং রোগ-বালাই
প্রতিরোধ করে এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ
করে

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার

- » সহনশীলতা প্রতিরোধের জন্য বিকল্প এমওএ গ্রুপ ব্যবহার করুন। আক্রান্ত ফল সরিয়ে ফেলুন।
- » সর্বদা কীটনাশকের ব্যবহারবিধি পড়ুন এবং যথাযথক্ষেত্রে ব্যবহার করুন (নিবন্ধিত ফসল এবং বালাই)।

পোকামাকড়ের ধরণ



সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	জাব পোকা	সাদা মাছি	শুঁয়োপোকা	ম্যাপ পোকা (টুটা অ্যাবসুলুটা)	ম্যাপ পোকা (লিরিওমাইয়া)	লাল মাকড়
ল্যাম্বডা-সাইহালোথ্রিন	3A	এস সি	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ডাইনোটোফুরান	4A	এস	✓	✓			✓	
স্পিনোসাদ	5	এস			✓	✓	✓	
স্পিনেটোরাম	5	এস সি			✓	✓	✓	
এ্যাবামেকটিন	6	এস (কিপিং এস)			✓	✓	✓	✓
থিওসাইক্লাম অক্সালেট	14	এস সি	✓	✓			✓	
ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	28	এস			✓	✓		
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	28	এস			✓	✓		
ব্যাসিলাস থুরিংজেনসিস	11A	সি			✓	✓		
অ্যাজাডিরেক্টিন (নিম নির্যাস)	UN	অজানা	✓	✓	✓	✓	✓	✓


কার্যপদ্ধতি (এমওএ) আইআরএসি অনুসারে; এস সি(পাকস্থলি + স্পর্শক); এস (সিস্টেমিক)

রোগের ধরণ



সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	মন্তব্য	নারী ধ্বসা	আগাম ধ্বসা	ব্যাকটেরিয়া জনিত দাগ	ব্যাকটেরিয়া জনিত চলে পড়া	মোজাইক ভাইরাস	পাতা কৌকড়ানো ভাইরাস
কপারযুক্ত ছত্রাকনাশক	M 01	পি	ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের ক্ষেত্রে: যখন প্রয়োজন কেবল তখনই ব্যবহার করুন;	✓	✓	✓	✓		
ক্লোরথালোনিল	M 05	পি		✓	✓				
ম্যানকোজেব	M 03	পি		✓	✓				
এ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন	11	পি+সি	প্রতি শস্যচক্রে সর্বোচ্চ ৪ বার	✓	✓			মাঠে ধূমপান থেকে বিরত থাকুন	সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণ করুন
প্রোপাক্সোকার্ব	28	পি+সি		✓	✓				
সাইমেক্সানিল	27	সি	প্রতিরোধমূলক উপাদান মিশ্রিত ট্যাকে (ক্লোরথালোনিল অথবা ম্যানকোজেব)	✓	✓				
মেটাক্সাফ্লিথ	4	পি+সি	সহনশীলতার উচ্চ স্তর - প্রতি বৌতুমে কেবলমাত্র ২ বার ব্যবহার	✓	✓				
ব্যাসিলাস সাবটিলিস	BM02	পি		✓	✓	✓	✓		
প্রতিরোধী জাত বা রোগমুক্ত চারা ব্যবহার করুন									

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) এফআরএসি অনুসারে; পি = প্রতিরোধমূলক (কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কার্যকর); সি = প্রতিকারমূলক



<https://growhow.eastwestseed.com>

ইস্ট-ওয়েস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক কপিরাইটকৃত © ২০২১। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

ওয়াগেনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার সহযোগিতায় কৃষি-রাসায়নিক সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।