




ফসল নির্দেশিকা মিষ্টি মরিচ/ ক্যাপসিকাম

• জমি প্রস্তুতি

- » সরু নালা, সেচ ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- » মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ এবং আগাছা বৃদ্ধিকে হ্রাস করার জন্য জৈব বা প্লাস্টিক মালচ স্থাপন করা যেতে পারে।
- » চারা রোপণের ৮-১০ দিন পর মাচা স্থাপন করুন
- » প্রতি হেক্টরে ২৬,৬০০ চারা (ফসলের জাত এবং মৌসুমের সাথে সমন্বয় করে)




বাংলা



• চারা উৎপাদন


- ◆ মিশ্রণ তৈরি: ১০ মিনিট ধরে তাপ দিন অথবা আধা দিনের জন্য পুরো রোদে রাখুন; অতঃপর ঠ্রে পূরণ করুন




- ◆ বীজ বপন করুন এবং চারার সুরক্ষা দিন




- ◆ সার্বক্ষণিক আর্দ্রতা বজায় রাখুন



- ◆ পানি দেয়া কমিয়ে দিন এবং শেষ বিকেলে চারা রোপণের ৫-৭ দিন পূর্বে অধিক সূর্যালোকে রাখুন



• সার প্রয়োগ



প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা ২৬,৬০০ এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে মৌসুম, মাটির অবস্থা এবং গাছের বৃদ্ধির ধরণ অনুসারে সার প্রয়োগ সমন্বয় করুন

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা



» পোকা-মাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করুন



সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে অসুস্থ চারা, পুরনো শস্য এবং আগাছা অবশ্যই তুলে ফেলুন এবং ধ্বংস করুন



শস্যচক্র পোকামাকড় এবং রোগ-বালাই প্রতিরোধ করে এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ করে

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার

- » সহনশীলতা প্রতিরোধের জন্য বিকল্প এমওএ গ্রুপ ব্যবহার করুন। আক্রান্ত ফল সরিয়ে ফেলুন।
- » সবদা কীটনাশকের ব্যবহারবিধি পড়ুন এবং যথাযথক্ষেত্রে ব্যবহার করুন (নিবন্ধিত ফসল এবং বালাই)।




সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	থ্রিপস	সাদা মাছি	জাব পোকা	ব্রড মাইট	জুঁয়োপোকা
ল্যাম্বডা-সাইহালোথ্রিন	3A	এস সি	✓	✓	✓	✓	✓
ডাইনোটোফুরান	4A	এস	✓	✓	✓		
স্পিনোসাদ	5	এস					✓
স্পিনেটোরাম	5	এস সি					✓
এ্যাবামেকটিন	6	এস (কিঞ্চিৎ এস)	✓			✓	✓
থিওসাইক্লাম অক্সালেট	14	এস সি	✓	✓	✓		
ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	28	এস					✓
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	28	এস					✓
ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস	11A	সি					✓
অ্যাজাডিরেক্টিন (নিম নির্যাস)	UN	অজানা	✓	✓	✓	✓	✓

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) আইআরএসি অনুসারে; এস সি(পাকস্থলি + স্পর্শক); এস (সিস্টেমিক)



সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	মন্তব্য	এনথ্রাকনোজ	পাতায় সার্কোস্পোরা ছত্রাকজনিত দাগ	পাউডারি মিলডিউ	ব্যাকটেরিয়া জনিত দাগ	ব্যাকটেরিয়া জনিত চলে পড়া	ভাইরাস
কপারযুক্ত ছত্রাকনাশক	M 01	পি	ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের ক্ষেত্রে: যখন প্রয়োজন কেবল তখনই ব্যবহার করুন;	✓	✓	✓	✓	✓	
ক্লোরোথালোনিল	M 05	পি		✓	✓	✓	✓	✓	জাবপোকা এবং সাদামাছির মতো বাহক পোকা নিয়ন্ত্রণ করুন
ম্যানকোজেব	M 03	পি		✓	✓	✓	✓	✓	
এ্যাজোক্সিপ্রোবিন	11	পি+সি	প্রতি শস্যচক্রে সর্বোচ্চ 8 বার	✓	✓	✓	✓	✓	
ব্যাসিলাস সাবটিলিস	BM02	সি		✓	✓	✓	✓	✓	
									প্রতিরোধী জাত বা রোগমুক্ত চারা ব্যবহার করুন

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) এফআরএসি অনুসারে; পি = প্রতিরোধমূলক (কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কার্যকর); সি = প্রতিকারমূলক



সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করুন

ভাল আবহাওয়া

ভাল নোজল

শ্রেণি করার পরে ধুয়ে ফেলুন

<https://growhow.eastwestseed.com>

ইস্ট-ওয়েস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক কপিরাইটকৃত © ২০২১। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

ওয়াগেনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার সহযোগিতায় কৃষি-রাসায়নিক সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।