



ফসল নির্দেশিকা চীনাকপি

• জমি প্রস্তুতি

- » সরু নালা, সেচ ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- » মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ এবং আগাছা বৃদ্ধিকে হ্রাস করার জন্য জৈব বা প্লাস্টিক মালচ স্থাপন করা যেতে পারে।
- » প্রতি হেক্টরে ২৬,৬০০ - ৪৪,৪০০ চারা (ফসলের জাত এবং মৌসুমের সাথে সমন্বয় করে)




বাংলা




• চারা উৎপাদন


- ◆ মিশ্রণ তৈরি: ১০ মিনিট ধরে তাপ দিন অথবা আধা দিনের জন্য পুরো রোদে রাখুন; অতঃপর ঐ পূরণ করুন



- ◆ বীজ বপন করুন এবং চারার সুরক্ষা দিন




বীজ বপনের গভীরতা = ২ টি বীজের আকার




- ◆ সার্বক্ষণিক আর্দ্রতা বজায় রাখুন



- ◆ পানি দেয়া কমিয়ে দিন এবং শেষ বিকেলে চারা রোপণের ৫-৭ দিন পূর্বে অধিক সূর্যালোকে রাখুন



• সার প্রয়োগ



Recommended amount based on crop optimum nutrient requirement and plant population of 26,600 per hectare.
Adjust application according to season, soil conditions and plant growth status.

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা



• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার

- » সহনশীলতা প্রতিরোধের জন্য বিকল্প এমওএ গ্রুপ ব্যবহার করুন।
- » সর্বদা কীটনাশকের ব্যবহারবিধি পড়ুন এবং যথাযথক্ষেত্রে ব্যবহার করুন (নিবন্ধিত ফসল এবং বালাই)।



পোকামাকড়ের
ধরণ

সাদা মাছি

জাব পোকা

শুঁয়োপোকা

ডায়মন্ড ব্যাক মথ

ফ্লি বিটল

সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	সাদা মাছি	জাব পোকা	শুঁয়োপোকা	ডায়মন্ড ব্যাক মথ	ফ্লি বিটল
ল্যান্ডা-সাইহালোথ্রিন	3A	এস সি	✓	✓	✓	✓	✓
ডাইনোটোফুরান	4A	এস	✓	✓			✓
স্পিনোসাদ	5	এস			✓	✓	✓
স্পিনেটোরাম	5	এস সি			✓	✓	✓
এ্যাবামেকটিন	6	এস (কিপিং এস)			✓	✓	✓
থিওসাইক্লাম অক্সালেট	14	এস সি	✓	✓			
ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	28	এস			✓	✓	
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	28	এস			✓	✓	
ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস	11A	সি			✓	✓	
অ্যাজাডিরেক্টিন (নিম নির্যাস)	UN	অজানা	✓	✓	✓	✓	✓

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) আইআরএসি অনুসারে; এস সি(পাকস্থলি + স্পর্শক); এস (সিস্টেমিক)



রোগের
ধরণ

কালচে পচা রোগ

ব্যাঙ্কেরিয়া জনিত নরম পচা রোগ

পাতায় অল্টারনারিয়া ছত্রাকজনিত দাগ

ডাউনি মিলডিউ

Active Ingredient	MoA	Action	Remarks	কালচে পচা রোগ	ব্যাঙ্কেরিয়া জনিত নরম পচা রোগ	পাতায় অল্টারনারিয়া ছত্রাকজনিত দাগ	ডাউনি মিলডিউ
কপারথিওক্সিড	M 01	পি	ব্যাঙ্কেরিয়া জনিত রোগের ক্ষেত্রে: যখন প্রয়োজন কেবল তখনই ব্যবহার করুন;	✓	✓	✓	✓
ক্লোরোথালোনিল	M 05	পি				✓	✓
ম্যানকোজেব	M 03	পি				✓	✓
এ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন	11	পি+সি	প্রতি শস্যচক্রে সর্বোচ্চ ৪ বার			✓	✓
প্রোপামোকার্ব	28	পি+সি				✓	✓
সাইমোজানিল	27	সি	প্রতিরোধমূলক উপাদান মিশ্রিত ট্যাংক (ক্লোরোথালোনিল অথবা ম্যানকোজেব)				✓
মেটালাক্সাইল	4	পি+সি	সহনশীলতার উচ্চ ঝুঁকি (প্রতি মৌসুমে কেবলমাত্র ২ বার ব্যবহার)				✓
ব্যাসিলাস সাবটিলিস	BM02	পি		✓	✓		✓

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) এফআরএসি অনুসারে; পি = প্রতিরোধমূলক (কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কার্যকর); সি = প্রতিকারমূলক

- সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করুন
- ভাল আবহাওয়া
- ভাল নোজল
- স্প্রে করার পরে ধুয়ে ফেলুন

<https://growhow.eastwestseed.com>

ইস্ট-ওয়েস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক কপিরাইটকৃত © ২০২১। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

ওয়াজেনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার সহযোগিতায় কৃষি-রাসায়নিক সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।