



ফসল নির্দেশিকা ওয়াস্কি কর্ন

• জমি প্রস্তুতি

- » সরু নালা, সেচ ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে
- » প্রতি হেক্টরে ৪৫,৪০০ চারা (ফসলের জাত এবং মৌসুমের সাথে সমন্বয় করে)



বাংলা




• বীজবপন



- » প্রতি গর্তে ১-২ টি করে বীজ বপন করুন এবং ভাল মানের মোচা পেতে চারা যখন ১০ সেমি লম্বা হবে তখন ১ টি চারা তুলে পাতলা করে দিন
- » যদি প্রতি দূরত্বে একটি করে বীজ হয়, তাহলে উপরে খালি জায়গায় একটি চারার ড্রে প্রস্তুত করুন



• সার প্রয়োগ




প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা ৪৫,৪০০ এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে মৌসুম, মাটির অবস্থা এবং গাছের বৃদ্ধির ধরণ অনুসারে সার প্রয়োগ সমন্বয় করুন

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা



- » পোকা-মাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করুন



সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে অসুস্থ চারা, পুরনো শস্য এবং আগাছা অবশ্যই তুলে ফেলুন এবং ধ্বংস করুন



শস্যচক্র পোকামাকড় এবং রোগ-বালাই প্রতিরোধ করে এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ করে

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার

- » সহনশীলতা প্রতিরোধে জন্য বিকল্প এমওএ গ্রুপ ব্যবহার করুন
- » সর্বদা কীটনাশকের ব্যবহারবিধি পড়ুন এবং যথাযথক্ষেত্রে ব্যবহার করুন (নিবন্ধিত ফসল এবং বালাই)।

পোকামাকড়ের ধরণ



জাব পোকা



শুঁয়োপোকা

সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	জাব পোকা	শুঁয়োপোকা
ল্যাম্বডা-সাইহালোথ্রিন	3A	এস সি	✓	✓
ডাইনোটেনফুরান	4A	এস	✓	
স্পিনোসাদ	5	এস		✓
স্পিনেটোরাম	5	এস সি		✓
এ্যাবামেকটিন	6	এস (কিঞ্চিৎ এস)		✓
থিওসাইক্লাম অক্সালেট	14	এস সি	✓	
ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	28	এস		✓
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	28	এস		✓
ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস	11A	সি		✓
অ্যাজাডিরেস্ট্রিন (নিম নির্যাস)	UN	অজানা		✓

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) আইআরএসি অনুসারে; এস সি(পাকস্থলি + স্পর্শক); এস (সিস্টেমিক)

রোগের ধরণ



মরিচা রোগ



ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ



ডাউনি মিলডিউ

সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	মন্তব্য	মরিচা রোগ	ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ	ডাউনি মিলডিউ
কপারযুক্ত ছত্রাকনাশক	M 01	পি		✓	✓	✓
ক্লোরোথ্যালোনিল	M 05	পি		✓	✓	✓
ম্যানকোজেব	M 03	পি		✓	✓	✓
এ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন	11	পি+সি	প্রতি শস্যচক্রে সর্বোচ্চ 8 বার	✓	✓	✓
প্রোপামোক্যার্ব	28	পি+সি			✓	✓
সাইমোক্সানিল	27	সি	প্রতিরোধমূলক উপাদান মিশ্রিত ট্যাংক (ক্লোরোথ্যালোনিল অথবা ম্যানকোজেব)			✓
মেটালাক্সাইল	4	পি+সি	সহনশীলতার উচ্চ ঝুঁকি- প্রতি মৌসুমে কেবলমাত্র ২ বার ব্যবহার			✓
ব্যাসিলাস সাবটিলিস	BM02	পি			✓	✓

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) এফআরএসি অনুসারে; পি = প্রতিরোধমূলক (কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কার্যকর); সি = প্রতিকারমূলক



সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করুন



ভাল আবহাওয়া



ভাল নোজল



শ্রেণী করার পরে ধুয়ে ফেলুন



KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

ইস্ট-ওয়েস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক কপিরাইটকৃত © ২০২১। সকল স্বত্ব সংরক্ষিত।

ওয়াজেনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার সহযোগিতায় কৃষি-রাসায়নিক সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।