




ফসল নিদেশিকা করলা

• জমি প্রস্তুতি

- » সরু নালা, সেচ ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- » মাটির আর্দ্ধতা সংরক্ষণ এবং আগাছা বৃদ্ধিকে হ্রাস করার জন্য জৈব বা প্লাস্টিক মালচ স্থাপন করা যেতে পারে।
- » চারা রোপণের পূর্বে মাচা স্থাপন।
- » প্রতি হেক্টারে ৮,৮০০ চারা (ফসলের জাত এবং মৌসুমের সাথে সমন্বয় করে)।




বাংলা




● চারা উৎপাদন


- মিশ্রণ তৈরি: ১০ মিনিট ধরে তাপ দিন অথবা আধা দিনের জন্য পুরো রোদে রাখুন; অতঃপর ট্রি পূরণ করুন




- বীজ বপন করুন এবং চারার সুরক্ষা দিন




- সার্বক্ষণিক আর্দ্ধতা বজায় রাখুন



- পানি দেয়া কমিয়ে দিন এবং শেষ বিকেলে চারা রোপনের ২-৩ দিন পূর্বে অধিক সূর্যালোকে রাখুন



• সার প্রয়োগ



প্রতি হেঠেরে চারার সংখ্যা ৮,৮০০ এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে
মৌসুম, মাটির অবস্থা এবং গাছের বৃদ্ধির ধরণ অনুসারে সার প্রয়োগ সমন্বয় করুন

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা



- » পোকা-মাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আঠাঁলো ফাঁদ (হলুদ এবং নীল) ব্যবহার করুন
- » ফলের মাছি পোকা দমনে মিষ্টি ফাঁদ, তুলসী পাতার নির্যাস কিংবা ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন



সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে অসুস্থ চারা,
পুরনো শস্য এবং আগাছা অবশ্যই তুলে ফেলুন
এবং ধ্বংস করুন



শস্যচক্র পোকামাকড় এবং রোগ-বালাই
প্রতিরোধ করে এবং মাটির উবর্ততা সংরক্ষণ
করে

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার

- » সহনশীলতা প্রতিরোধের জন্য বিকল্প এমওএ গ্রুপ ব্যবহার করুন।
- » সর্বদা কীটনাশকের ব্যবহারবিধি পড়ুন এবং যথাযথক্ষেত্রে ব্যবহার করুন (নিরাপিত ফসল এবং বালাই)।




সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	জাব পোকা	সাদা মাছি	শুঁয়োপোকা	ফলের মাছি পোকা
ল্যাম্বডা-সাইহালোথিন	3A	এস সি	✓	✓	✓	✓
ডাইনোটেফুরান	4A	এস	✓	✓		✓
স্পিনোসাদ	5	এস			✓	✓
স্পিনেটোরাম	5	এস সি			✓	✓
এ্যাবামেক্টিন	6	এস (কিডিং এস)			✓	
থিওসাইক্লাম অক্সালেট	14	এস সি	✓	✓		
ক্লোরান্টানলিপ্রোল	28	এস			✓	
ফুরেনডিয়ামাইড	28	এস			✓	✓
ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস	11A	সি			✓	✓
অ্যাজিডিরেক্টিন (নিম নির্যাস)	UN	অজানা	✓	✓	✓	✓

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) আইআরএসি অনুসারে; এস সি(পাকছলি + স্পর্শক); এস (সিস্টেমিক)



সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	মন্তব্য	ডাউনি মিহিড়ি	পাউডারি মিহিড়ি	পাতায় সার্কেপোরা ছত্রাকজনিত দাগ	গামি টেক্টম রাইট	ভাইরাস
কপারায়কু ছত্রাকনাশক	M 01	পি		✓	✓	✓	✓	
ক্লোরোথালোনিল	M 05	পি		✓	✓	✓	✓	
ম্যানকোজের	M 03	পি		✓	✓	✓	✓	
এ্যাজেক্সিস্ট্রোবিন	11	পি+সি	প্রতি শস্যচক্রে সর্বোচ্চ ৪ বার	✓	✓	✓	✓	
প্রোপামোকার্ভ	28	পি+সি		✓	✓			
সাইমোরানিল	27	সি	প্রতিশ্রেদ্ধস্বরূপ উপাদান মিহিড়ি ট্যাকে (ক্লোরোথালোনিল অবধার যানবাহনের)	✓				
মেটালাক্যাল	4	পি+সি	সর্বশ্রেণীতার উচ্চ ঘৰ্য (প্রতি মৌসুমে বেলবেচা ২ বার ব্যবহার)	✓				
ব্যাসিলাস সার্টিলিস	BM02	পি		✓	✓		✓	

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) এফআরএসি অনুসারে; পি = প্রতিরোধমূলক (কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কার্যকর); সি = প্রতিকারমূলক



সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করুন

ভাল আবহাওয়া

ভাল নোজল

স্পে করার পরে ধূমে ফেলুন