




Guide Pratique Tomate

• Préparation du sol

- » Des allées étroites améliorent l'irrigation et le drainage
- » Un paillis organique ou en plastique peut être installé pour conserver l'humidité du sol et minimiser la croissance des mauvaises herbes.
- » Installer les tuteurs 8-10 jours après repiquage
- » 26,600 plantes/hectare (ajuster selon la variété et la saison)




Français



• Production de plants


- ◆ Préparation du terreau: Cuire 10 mn ou placer en plein soleil pendant une demi-journée. Remplir les plaques.




- ◆ Semer et protéger les plantules




- ◆ Maintenir une humidité constante



- ◆ Réduire l'arrosage et exposer davantage au soleil 5 à 7 jours avant repiquage en fin d'après midi



- **Application d'engrais**




Quantité recommandée basée sur les besoins nutritionnels optimaux de la culture et sur une population de 26,600 plantes par hectare.
Ajuster l'application en fonction de la saison, des conditions du sol et de l'état de croissance des plantes.

- **Lutte intégrée contre les nuisibles**



» Utilisez des pièges collants pour surveiller et piéger en masse les insectes ravageurs



Pour éviter la propagation des maladies, les plantes malades, vieilles, et les mauvaises herbes doivent être retirées et détruites



La rotation des cultures empêche la prolifération des insectes ravageurs et des maladies. Elle restaure la fertilité du sol

• Lutte intégrée contre les ravageurs et utilisation sûre des pesticides

- » Alternier les produits ayant des modes d'action (MoA) différents pour éviter les résistances
- » Lisez toujours l'étiquette du pesticide et son utilisation prévue (culture et ravageur enregistrés)




Matière active	MoA	Action	Puceron	Mouche blanche	Chenille	Tuta absoluta	Liriomyza	Acariens rouges
Lambda-cyhalothrine	3A	EC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dinotéfurane	4A	S	✓	✓			✓	
Spinosad	5	S			✓	✓	✓	
Spinétorame	5	EC			✓	✓	✓	
Abamectine	6	SC (S limité)			✓	✓	✓	✓
Oxalate de thiocyclam	14	EC	✓	✓			✓	
Chlorantraniliprole	28	S			✓	✓		
Flubendiamide	28	S			✓	✓		
Bacillus thuringiensis	11A	C			✓	✓		
Azadirachtine (extrait de neem)	UN	Inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modes d'Action (MoA), source IRAC; EC (Estomac + Contact); S (Systémique)



Matière active	MoA	Action	Remarques	Brûlure alternarienne	Tache septorienne	Tache bactérienne	Fonte des semis	Virus de la Mosaïque	Virus des feuilles en cuillère
Fongicide à base de cuivre	M 01	P	Pour les maladies bactériennes: À n'utiliser que lorsque cela est nécessaire; ne pas en abuser pour éviter une éventuelle formation de résistance	✓	✓	✓	✓		
Chlorothalonil	M 05	P		✓	✓				
Mancozèbe	M 03	P		✓	✓				
Azoxystrobine	11	P + C	4 fois maximum par cycle de culture	✓					
Propamocarbe	28	P + C		✓					
Cymoxanil	27	C	Réservoir mélangé avec préventif (chlorothalonil ou mancozèbe)	✓					
Métalaxyl	4	P + C	Risque élevé de résistance (à n'utiliser que 2 fois par cycle de culture)	✓					
Trichoderma spp.	BM02	P		✓	✓	✓	✓		
Utiliser des variétés résistantes exempt de maladies									

Modes d'Action (MoA) source FRAC; P = Préventif (efficace uniquement lorsque les symptômes de la maladie ne sont pas encore apparus), C= curatif



<https://growhow.eastwestseed.com>

Copyright © 2021 par East-West Seed Foundation. Tous droits réservés.

Les recommandations agrochimiques ont été élaborées en coopération avec Wageningen University & Research