




Guía de Cultivo **CUNDEAMOR**

• Preparación de terreno

- » Las calles estrechas ayudan con el riego y el drenaje
- » Instale el tutorado antes del trasplante
- » 8,800 plantas/ha



SPANISH




• Producción de plántula


Preparación del sustrato: calentar por 10 minutos o bajo sol directo por medio día; llenar la bandeja



Siembra las semillas y proteja la plántula




Profundidad de siembra = tamaño de 2 semillas




Mantener la humedad constante



Reducir el agua y exponer a más sol 2-3 días antes de trasplantar en horas de la tarde



• Aplicación de fertilizante



La recomendación sobre cantidad de fertilizante esta basada para una densidad de 26,600 plantas por hectárea

Para prevenir que la infección se propague, plantas enfermas, cultivos antiguos y malezas deben ser removidas



• Uso efectivo y seguro de pesticidas



1 Utilice equipo de protección



2 Buen clima



3 Buena boquilla



4 Lavarse después de aplicar

Tipos de plagas de insectos



1 Mosca blanca 2 Áfido 3 Gusano 4 Mosca de la fruta

Ingrediente activo (Ia)	MoA	Objetivo	1 / 2	3	4
Acetamipride	2B	SC	☺		
Lambda cialotrina	3A	SC	☺☺	☺	
Flupyradifurone	4A	S	☺☺☺		
Butenolide	4A	S	☺☺		
Sulfotamine	4A	S	☺☺		☺☺
Spinosad	5	S		☺☺	☺☺
Flonicamid	6	SC (Leve S)		☺☺	☺☺
Tiociclam oxalato	14	SC	☺		
Chlorantraniliprole	28	S		☺☺	
Flubendiamida	28	S		☺☺	☺☺

Modo de Acción (MoA); EC (Estómago + Contacto); S (Sistémico)



- » Alternar grupos de modos de acción (MoA) para prevenir resistencia
- » Controle los insectos chupadores para prevenir el virus
- » Remueva plantas y frutas infectadas
- » Reduzca la aplicación de 40 DDT si esta saludable



Ingrediente activo (Ia)	MoA	Enfermedad objetivo	Observaciones
Fosetyl-AI	Preventivo	Amplio espectro	
Profineb	Preventivo	Amplio espectro	
Azoxystrobin	Preventivo + Curativo	Mildió polvoso	
		Cercospora	Máximo 4 veces por ciclo del cultivo
Propamocarb	Preventivo + Curativo	Mildió veloso	
Trifloxystrobin + Tebuconazole	Curativo	Mildió veloso	Bomba mezclado con preventivo (Clorotalonil o Mancozeb)
Metalaxyl	Preventivo + Curativo	Mildió veloso	Alto riesgo de resistencia (usar solamente 2 veces por ciclo)

Tipos de enfermedades



Mildió veloso



Mildió polvoso



Cercospora



Virus

<http://guides.eastwestseed.com>

Esta guía técnica es parte de una serie producida por EWSF © 2017 Derechos de autor de la Fundación East-West Seed. Todos los derechos reservados. Las recomendaciones de agroquímicos han sido desarrollados en cooperación con la Universidad Wageningen e Investigación

