




Panduan Budidaya **OYONG**

• Persiapan Lahan

- » Parit kecil untuk irigasi dan drainase
- » Pasang Ajir sebelum Pindah Tanam
- » 4,400 tanaman per hektar



BAHASA




• Pembibitan


Persiapan media: panaskan media selama 10 menit, atau jemur setengah hari dibawah matahari; isi tray semai





Semai benih dan berikan perlindungan




kedalaman semai = 2 kali ukuran benih



Pastikan kelembaban terjaga



Kurangi air dan letakkan di tempat yang terkena terik matahari 2-3 hari sebelum pindah tanam di sore hari




• Penanaman Langsung



» letakkan 2 benih per lubang tanam, kemudian sisakan hanya 1 tanaman ketika tingginya 10 cm



• Aplikasi Pemupukan



Jumlah pupuk yang direkomendasikan berdasar jumlah populasi 4,400 tanaman per Hektar

• Cara Memperoleh Hasil Tinggi

Untuk menghindari penyebaran penyakit, tanaman sakit, tanaman sudah tua, dan rumput harus dicabut



• Keselamatan dan Efektifitas Penggunaan Pestisida



1 Gunakan Alat Pelindung Diri



2 Cuaca yang Mendukung



3 Nozzle yang berfungsi baik



4 Cuci setelah digunakan menyemprot

Jenis hama serangga



1 Aphid

2 Kutu Kebul

3 Ulat


4 Penggerak daun

5 Kumbang

6 Lalat buah

| Bahan Aktif | Mode Aksi | Target | 1 / 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|-----------|-------------|-------|---|---|---|---|
| Fipronil | 2B | SC | ✗ | | ✗ | | |
| Lambda-cyhalothrin | 3A | SC | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Dinotefuran | 4A | S | ✗ | ✗ | ✗ | | |
| Thiamethoxam | 4A | S | ✗ | ✗ | ✗ | | |
| Imidacloprid | 4A | S | ✗ | ✗ | ✗ | | |
| Spinosad | 5 | S | ✗ | ✗ | ✗ | | |
| Abamectin | 6 | SC (Agak S) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| Thiocyclam oxalate | 14 | SC | ✗ | | ✗ | | |
| Chlorantraniliprole | 28 | S | ✗ | | ✗ | | |
| Flubendiamide | 28 | S | ✗ | | ✗ | | |

Mode Aksi; SC (Racun Perut + Kontak); S (Sistemik)



- » Alternatif bahan kimia sesuai Mode Aksi untuk mencegah resistensi
- » Kendalikan serangga penghisap untuk mencegah penyebaran virus
- » Cabut tanaman dan buah yang terinfeksi
- » Kurangi penyemprotan ketika tanaman umur 40 HST, apabila tanaman sehat

| Bahan Aktif | Mode Aksi | Target Penyakit | Keterangan |
|----------------|-------------------------|---|--|
| Chlorothalonil | Pencegahan | Spektrum Luas | |
| Mancozeb | Pencegahan | Spektrum Luas | |
| Azoxystrobin | Pencegahan + Pengobatan | Embun Tepung, Batang busuk berlendir | Maksimal 4 kali aplikasi setiap musim tanam |
| Propamocarb | Pencegahan + Pengobatan | Downy mildew | Tangki dicampur dengan bahan aktif untuk pencegahan (Chlorothalonil atau Mancozeb) |
| Cymoxanil | Pengobatan | Downy mildew | |
| Metalaxyl | Pencegahan + Pengobatan | Downy mildew | Bahan aktif yang beresiko tinggi resisten (gunakan hanya 2 kali per musim) |

Jenis Serangan Penyakit



Batang busuk berlendir



Embun Tepung



Downy mildew



Virus