



Panduan Budidaya CAISIM

• Persiapan Lahan

- » Parit kecil untuk irigasi dan drainase
- » 222,200 tanaman per hektar





BAHASA



• Pembibitan

- » Gunakan kayu/bambu untuk membuat jarak dan alur tanam
- » Tabur benih tipis-tipis pada alur
- » Tahapan jarak tanam :
 - hingga 10 cm untuk tanaman muda/baby
 - hingga 20 cm untuk tanaman agak dewasa
 - 25-30 cm untuk tanaman dewasa
- » Tanaman hasil penjarangan dapat dijual atau dikonsumsi



• Aplikasi Pemupukan




100 g



50 g

- » Sebar pupuk hingga jarak 2 m
- » Bersihkan rumput sebelum aplikasi pemupukan



Jumlah pupuk yang direkomendasikan berdasar jumlah populasi 222,200 tanaman per Hektar

• Cara Memperoleh Hasil Tinggi

Untuk menghindari penyebaran penyakit, tanaman sakit, tanaman sudah tua, dan rumput harus dicabut



• Keselamatan dan Efektifitas Penggunaan Pestisida

- 1  **Gunakan Alat Pelindung Diri**
- 2  **Cuaca yang Mendukung**
- 3  **Nozzle yang berfungsi baik**
- 4  **Cuci setelah digunakan menyemprot**





| Bahan Aktif | Mode Aksi | Target | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|-----------|-------------|---|---|---|---|
| Fipronil | 2B | SC | 🐛 | | | 🐛 |
| Lambda-cyhalothrin | 3A | SC | 🐛 | 🐛 | 🐛 | 🐛 |
| Dinotefuran | 4A | S | 🐛 | | | 🐛 |
| Thiamethoxam | 4A | S | 🐛 | | | 🐛 |
| Imidacloprid | 4A | S | 🐛 | | | 🐛 |
| Spinosad | 5 | S | | 🐛 | | |
| Abamectin | 6 | SC (Agak S) | | 🐛 | | |
| Thiocyclam oxalate | 14 | SC | 🐛 | | | |
| Chlorantraniliprole | 28 | S | | 🐛 | 🐛 | |
| Flubendiamide | 28 | S | | 🐛 | 🐛 | |

Mode Aksi; SC (Racun Perut + Kontak); S (Sistemik)

- » Alternatif bahan kimia sesuai Mode Aksi untuk mencegah resistensi
- » Kurangi penyemprotan pada umur tanaman 35 HST, apabila tanaman sehat
- » Selalu Cek Interval Penggunaan Pestisida Sebelum Masa Panen

| Bahan Aktif | Mode Aksi | Target Penyakit | Keterangan |
|----------------|-------------------------|------------------------|---|
| Chlorothalonil | Pencegahan | Spektrum Luas | |
| Mancozeb | Pencegahan | Spektrum Luas | |
| Azoxystrobin | Pencegahan + Pengobatan | Bercak daun alternaria | Maksimal 4 kali aplikasi setiap musim tanam |
| Propamocarb | Pencegahan + Pengobatan | Downy mildew | |
| Iprodione | Pencegahan + Pengobatan | Alternaria leaf spot | |





EAST-WEST SEED

<http://guides.eastwestseed.com>

*This crop guide is part of a series produced by EWSF. ©2017 Copyright of East-West Seed Foundation. All Rights Reserved
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research*

 **WAGENINGEN**
UNIVERSITY & RESEARCH