



KNOWLEDGE
TRANSFER


শস্য বিষয়ক নিৰ্দেশনা বিলাহী

• মাটিৰ প্ৰস্তুতি

- » সংকীৰ্ণ পথবোৰে জলসিঞ্চন আৰু নিষ্কাশনত সহায় কৰে
- » জৈৱিক বা প্লাষ্টিকৰ মাল্চ স্থাপন কৰা হ'ব পাৰে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সংৰক্ষণ কৰক আৰু অপতৃণৰ বিকাশ হ্ৰাস কৰক
- » সংৰোপণৰ 8-10 দিন পিছত ট্ৰেলিছ স্থাপন কৰক
- » 26,600 উদ্ভিদ/হেক্টৰ (বিভিন্নতা আৰু ঋতু অনুসৰি মিলাওক)




ASSAMESE



গজালি তৈয়াৰ কৰা


- সাবষ্ট্ৰেট প্ৰস্তুতি: 10 মিনিটৰ বাবে গৰম কৰক বা আধা দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰ'দত ৰাখক, তাৰ পিছত ট্ৰে ভৰ্তি কৰক




- গুটি সিঁচা আৰু কঠীয়া ৰক্ষা কৰা




- আৰ্দ্ৰতা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা



- আবেলি পলমকৈ সংৰোপণ কৰাৰ 5-7 দিন আগতে পানী হ্ৰাস কৰক আৰু অধিক সূৰ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে



- পোনপটীয়াকৈ গুটি সিঁচা



"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত ৪,৪০০জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"

- একাকীকৃত পোকৰ ব্যৱস্থাপনা



» পোকপতঙ্গ নিৰিক্ষণ আৰু বহুত পৰিমাণৰ জালত ধৰিবলৈ
ষ্টিকি ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক।



সংক্ৰামণ বিয়পা ৰোধ কৰিবলৈ ৰোগীয়া গছ,
পুৰণা শস্য আৰু অপতৃণবোৰ আঁতৰ কৰক
বা নষ্ট কৰি পেলাওক।



শস্যাবৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ
ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে।

একীকৃত পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা আৰু সুৰক্ষিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ।

- » প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ(এমআ'এ) গ্ৰুপ
- » সদায় কীটনাশক দ্ৰব্যৰ লেবেল আৰু ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য পঢ়িব (পঞ্জীকৃত শস্য আৰু পোকপতঙ্গ)



ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	এফিড	বগা পখিলা	পলু	টুটা এবচেলুটা	লিৰিওমিজা	বঙা মকৰা মাইট
লম্বদা-ছায়লোথ্ৰিন	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ডিনোতেনফেৰন	4A	S	✓	✓			✓	
স্পিনোছড	5	S			✓	✓	✓	
স্পাইনেটোৰাম	5	SC			✓	✓	✓	
স্পিনেটোৰাম	6	SC (সামান্য S)			✓	✓	✓	✓
থিয়চাইক্ৰম অক্সলেট	14	SC	✓	✓			✓	
ক্লোৰথালোনিপ্ৰ'লে	28	S			✓	✓		
ফলুবোণ্ডুমিড	28	S			✓	✓		
বচিলুছ থুৰিনজিনেছিছ	11A	C			✓	✓		
অজাডিৰেচাটিন (নীম আৰক)	UN	অজ্ঞাত	✓	✓	✓	✓	✓	✓

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; SC (পেট- সম্পৰ্ক) ; S (প্ৰণালীবদ্ধ)



ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	মতামত	লেট ব্লাইট	আগতীয়া ব্লাইট	বেক্টেৰিয়েল স্পট	বেক্টেৰিয়েল উইল্ট	মাচাইক ভাইৰাচ
Copper-based Fungicides	M 01	P	বেক্টেৰিয়েল প্ৰকাৰৰ বোগৰ বাবে কেৱল প্ৰাথমিক হ'লেহে ব্যৱহাৰ কৰিব, সাধাৰণ প্ৰতিৰোধক বুলি পৰিগণনা কৰিবলৈ অত্যধিক ব্যৱহাৰ নকৰিব	✓	✓	✓	✓	
Chlorothalonil	M 05	P		✓	✓			
Mancozeb	M 03	P		✓	✓			
Azoxystrobin	11	P + C	প্ৰতি শস্য চক্ৰত সৰ্বাধিক 4 গুণ	✓				
Propamocarb	28	P + C		✓				
Cymoxanil	27	C	Tank mixed with preventive (Chlorothalonil or Mancozeb)	✓				
Metalaxyl	4	P + C	High risk of resistance (only use 2 times per season)	✓				
Bacillus subtilis	BM02	P		✓	✓	✓	✓	

প্ৰতিৰোধী প্ৰকাৰ বা বোগ-মুক্ত পুলি ব্যৱহাৰ কৰিব

এফআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে বোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়) , C = বোগনিবাৰক

- সুৰক্ষিত গিয়েৰ পৰিধান কৰক
- ভাল বতৰ
- ভাল নলী
- স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ধুৱ।



<https://growhow.eastwestseed.com>

*ইষ্ট-ৱেষ্ট ছীড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বলিপি সংৰক্ষিত।

ৱেগেনিংগন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাশ কৰা হৈছে