




শস্য বিষয়ক নিৰ্দেশনা নাৰ্জি ফুল

• মাটিৰ প্ৰস্তুতি

- » সংকীৰ্ণ পথবোৰে জলসিঞ্চন আৰু নিষ্কাশনত সহায় কৰে
- » জৈৱিক বা প্লাষ্টিকৰ মাল্চ স্থাপন কৰা হ'ব পাৰে মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সংৰক্ষণ কৰক আৰু অপতৃণৰ বিকাশ হ্ৰাস কৰক
- » সংৰোপণৰ 8-10 দিন পিছত ট্ৰেলিছ স্থাপন কৰক
- » 16,660-33,330 উদ্ভিদ/হেক্টৰ (বিভিন্নতা আৰু খাত অনুসৰি মিলাওক)



ASSAMESE



গজালি তৈয়াৰ কৰা

- সাবষ্ট্ৰেট প্ৰস্তুতি: 10 মিনিটৰ বাবে গৰম কৰক বা আধা দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ব'দত ৰাখক, তাৰ পিছত ট্ৰে ভৰ্তি কৰক




1 ৰ পৰা 2 অংশ মাটি




1 অংশ ভালদৰে পচি যোৱা সাৰ




1 অংশ বালি বা কাৰ্বনযুক্ত চাউলৰ ছল



- গুটি সিঁচা আৰু কঠীয়া ৰক্ষা কৰা



সিঁচা গভীৰতা = 2 টা বীজৰ আকাৰ



ভাল বায়ু
সঞ্চালন

- আৰ্দ্ৰতা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা



পুৱা



আবেলি



10 লিটাৰ পানী + 10-15 গ্ৰাম কেলচিয়াম নাইট্ৰেট;

10 দিনপিছত পুলি বোৰ ভিজাওক
উপ্থান (যদি প্ৰয়োজন হয়)




15-20 দিন

- আবেলি পলমকৈ সংৰোপণ কৰাৰ 2-3 দিন আগতে পানী হ্ৰাস কৰক আৰু অধিক সূৰ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে



পোনপটীয়াকৈ গুটি সিঁচা




"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত ৪,৪০০জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"

একাকীকৃত পোকৰ ব্যৱস্থাপনা



» পোকপতঙ্গ নিৰিক্ষণ আৰু বহুত পৰিমাণৰ জালত ধৰিবলৈ ষ্টিকি ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক।



টো প্ৰিভেণ ইনফেক ফোম সপিয়াডিং, সিক প্লেণ্টচ, ওল্ড ক্ৰপচ এএনডি উইডচ মাস বিই ৰিমুভড এএনডি ডেচট্ৰয়েড।

ডিও পিংচিং ওআৰ টপ পুনিং এটি থে ৫থি নোড ওআৰ 10-12 ডেইচ আফটাৰ ট্ৰানচপ্লাণ্টিং।



শস্যাবৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে।

• একীকৃত পতঙ্গ ব্যৱস্থাপনা আৰু সুৰক্ষিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ।

- » প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ৰোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ(এমঅ'এ) গ্ৰুপ
- » সদায় কীটনাশক দ্ৰব্যৰ লেবেল আৰু ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য পঢ়িব (পঞ্জীকৃত শস্য আৰু পোকপতঙ্গ)



ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	এফিডস	হোয়াইটএফলাই	পলু	লিফমাইনাৰ (লিৰিওমাইজা)	ৰেড স্পাইডাৰ মাইটচ
ডিনোতেফুৰন	3A	SC	✓	✓	✓	✓	
স্পিনোছড	4A	S	✓	✓		✓	
স্পাইনেটোৰাম	5	S			✓	✓	
স্পিনেটোৰাম	5	SC			✓	✓	
থিয়চাইক্ৰম অক্সলেট	6	SC (সামান্য S)			✓	✓	
ক্লোৰট্ৰেনিলিপ্ৰ'লে	14	SC	✓	✓		✓	
ফ্লুবেন্ডিয়ামিড	28	S			✓		
বচিলুছ থুৰিনজিনেছিছ	28	S			✓		
অজাডিৰেচটিন (নীম আৰক)	11A	C			✓		
	UN	অজ্ঞাত	✓	✓	✓	✓	

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী : SC (পেট+ সম্পৰ্ক) ; S (প্ৰণালীবদ্ধ)



ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	মতামত	বেক্টেৰিয়েল উইল্ট	বেক্টেৰিয়াক পাতৰ দাগ	পাউদাৰ মিল্ডেউ	বোড্ৰিটচ্ ফ্লোৱাৰ ব্লাইট
কোপাৰ ভিত্তিক	M 01	P	বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগৰ বাবে, কেৱল প্ৰয়োজন হ'লেহে ব্যৱহাৰ কৰিব; সামান্য প্ৰতিৰোধ বৃদ্ধি পৰিবহাৰ কৰিবলৈ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ নকৰিব	✓	✓	✓	
ক্ল'ৰোথালানিল	M 05	P			✓	✓	
মেনকোজেব	M 03	P			✓	✓	
এজক্সোষ্টোবিন	11	P + C	প্ৰতি শস্য চক্ৰত সৰ্বাধিক 4 গুণ		✓	✓	
বেচিলুছ চাৰাটিলছ	BM02	P		✓		✓	

এফআৰএচি ভিত্তিক কাৰ্য্যপ্ৰণালী : P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়) ,C = ৰোগনিবাৰক

- 1 সুৰক্ষিত গিয়েৰ পৰিধান কৰক
- 2 ভাল বতৰ
- 3 ভাল নলী
- 4 স্পেৰ কৰাৰ পিছত ধুৱ।



<https://growhow.eastwestseed.com>

*ইষ্ট-ৱেষ্ট ছীড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বলিপি সংৰক্ষিত।

ৱেগেনিংঙন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাশ কৰা হৈছে