



KNOWLEDGE
TRANSFER


শস্য বিষয়ক নিৰ্দেশনা অমিতা

• মাটিৰ প্ৰস্তুতি

- » প্ৰোভাইড গুড ডাইনেজ টো প্ৰিভেণ ওয়াটাৰলগিং
- » অৰগেনিক ওআৰ প্লাচটিক মালচ মে বিই ইনচটল টো কনচাৰভ সয়েল মইচটাৰ এএনডি মিনিমাইজ উইড গ্ৰাউথ
- » 1,100 -1,340 প্লেণ্টচ/হা (এডজাস একোৰডিং টো থে ভেৰিয়েটি)



ASSAMESE



• পিআৰই-গাৰমিনেশ এএনডি সীডলিং প্ৰডাকশন

- সাৰষ্ট্ৰেট প্ৰস্তুতি: 10 মিনিটৰ বাবে গৰম কৰক বা আধা দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰ'দত ৰাখক, তাৰ পিছত ট্ৰে ভৰ্তি কৰক




1 ৰ পৰা 2 অংশ মাটি



1 অংশ ভালদৰে পচি যোৱা সাৰ



1 অংশ বালি বা কাৰ্বনযুক্ত চাউলৰ ছল




অপশন 1:

- সোক থে সীড ইন 1 লিটাৰ অফ ওয়াটাৰ মিক উইথ 100 গ্ৰামচ অফ পটাছিয়াম নাইট্ৰেট (13-0-44) ফোৰ 30 মিনিউটচ
- সো ইমিডিয়েটলি আফটাৰ সোৰ্কিং

অপশন 2:


- সোক থে সীড ফোৰ 3-5 ডেইচ, চেংজিং থে ওয়াটাৰ ডেইলি

- গুটি সিঁচা আৰু কঠীয়া ৰক্ষা কৰা



সিঁচা গভীৰতা = 2 টা বীজৰ আকাৰ

- ট্ৰানচফাৰ ইন পলিথাইলিন বেগ 14 ডেইচ আফটাৰ সোইং (দাস)
- ডৰেন কেলচিয়াম নাইট্ৰেট ওআৰ 15-15-15 (40 জি/16 লে ওয়াটাৰ) আফটাৰ ট্ৰানচফাৰ; ৰিপ্ৰিট আফটাৰ 7 ডেইচ




10 চিএম



- কমপ্ৰেচ
- এডজাস স্পেচিং (10 চিএম এক্স 10 চিএম) আফটাৰ 14 ডেইচ

- আৰ্দ্ৰতা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা



পুৱা



আবেলি




41 -45 দিন

- আবেলি পলমকৈ সংৰোপণ কৰাৰ 2-3 দিন আগতে পানী হ্ৰাস কৰক আৰু অধিক সূৰ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে




আবেলি পলমকৈ সংৰোপণ কৰা আৰু তাৰ পিছত পানী

• সাৰ প্ৰয়োগ



"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত ৪,৪০০জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"


• শস্য চপোৱা আৰু শস্য চপোৱাৰ পিছত অনুশীলন



ফ্ৰুইটচ আৰে ৰেডি ফোৰ হাৰভেচ আৰাউন
6-7 মন্থচ আফটাৰ ট্ৰানচপ্লাণ্টিং



হাৰভেচ কেন বিই ডোন বিটুইন
9 এগ্ৰম - 3 পিএগ্ৰম



প্লেচ থে ফ্ৰুইট ইন আ পেডেড কনটেইনাৰ

একীকৃত পাতক বৰেহা Integrated Pest Management System and Sustainable Use of Pesticides



- » ইউজ স্টিকি ট্ৰাপচ টো মনিটৰৰ এএনডি মাছ ট্ৰাপ ইনচেক পেচটচ
- » অলটাৰনেট মোয়া ফ্ৰপচ টো প্ৰিভেণ ৰেচিচটেন
- » অলওয়েচ ৰীড পেচটিচাইড লেবেল এএনডি ইনটেন ইউজ (ৰেজিচটাৰ কেৰপ এএনডি পেচ)




ক্রিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	বগা পখিলা	এফিড	মিলিবাগ	ৰঙা মকৰা চাহী	ফলৰ মাখি
লম্বা-ছায়ালোথ্ৰিন	3A	SC	✓	✓	✓	✓	
ডিনোতেফুৰন	4A	S	✓	✓	✓		
স্পিনোছড	5	S			✓		
স্পাইনেটোৰাম	5	SC			✓		
স্পিনেটোৰাম	6	SC (সামান্য S)				✓	
থিয়চাইক্লম অক্সলেট	14	SC	✓	✓			
ক্লোৰট্ৰেনিলিপ্ৰ'লে	28	S					
ফলুবেণ্ডিয়মিড	28	S					
বচিলুছ থুৰিনজিনেছিছ	11A	C					
অজাডিৰেচটিন (নীম আৰক)	UN	অজ্ঞাত	✓	✓	✓	✓	



ক্রিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	মতামত	জেলুকা লগা ৰোগ	মৰহি যোৱা
ক'পাৰ ভিত্তিক	M 01	P	ফোৰ বেকটেৰিয়েল ডিজিজ: ইউজ অনলি যোয়েন নেচেৰা:ডিও নট গুভাৰচ টো অভয়েড পোনে ৰেচিচটেন বিন্ড ইউপি	✓	✓
ভেকুৰানাশক	M 05	P		✓	
ক্লোৰথালোনি	M 03	P		✓	
মনকোজেব	11	P + C	প্ৰতি শস্য চক্ৰত সৰ্বাধিক 4 বাৰ	✓	
এজোষ্ট্ৰ'বিন	28	P + C		✓	
প্ৰ'পামোকাৰ্ব	27	C	প্ৰতিৰোধক মিশ্ৰিত টোফ্লি (ক্ল'ৰথালোনি বা মনকোজেব)	✓	
ছায়ামোক্সনিল	4	P + C	প্ৰতিৰোধকৰ উচ্চ ক্ষমতা (প্ৰতিটো খাজুত কেৱল 2বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব)	✓	
মেটালক্সল	BM02	P		✓	
বচিলিয়াছ ছাবটিলিছ					

এফআৰএচি ভিত্তিক কাৰ্যপ্ৰণালী ; P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়) ,C = ৰোগনিবাৰক



সুৰক্ষিত গিয়েৰ
পৰিধান কৰক

ভাল বতৰ

ভাল নলী

স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ধুৱা।



<https://growhow.eastwestseed.com>

»ইষ্ট-ৱেষ্ট ছীড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বলিপি সংৰক্ষিত।

বেগেনিঙন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাশ কৰা হৈছে