



শস্য বিষয়ক নিৰ্দেশনা তৰমুজ

• মাটিৰ প্ৰস্তুতি

- » জলসিঞ্চন আৰু খাল ব্যৱস্থাত ঠেক পথে সহায় কৰে
- » জৈৱিক অথবা প্লাষ্টিক মল্চ মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু অপতৃণৰ বৃদ্ধি কম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
- » পুলি ৰোপনত আগতে ট্ৰেলিছ স্থাপন কৰা হয়
- » প্ৰতি হেক্টৰত 26,600 জোপা গছ (বিভিন্ন জাত আৰু ঋতু অনুসৰি সলনি কৰা হয়)

ASSAMESE



গজালি তৈয়াৰ কৰা


- সাবষ্ট্ৰেট প্ৰস্তুতি: 10 মিনিটৰ বাবে গৰম কৰক বা আধা দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰ'দত ৰাখক, তাৰ পিছত ট্ৰে ভৰ্তি কৰক




- গুটি সিঁচা আৰু কঠীয়া ৰক্ষা কৰা




- আৰ্দ্ৰতা অপৰিৱৰ্তিত ৰখা



- আবেলি পলমকৈ সংৰোপণ কৰাৰ 2-3 দিন আগতে পানী হ্ৰাস কৰক আৰু অধিক সূৰ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে



• ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা




"শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিত্তিত অনুমোদিত পৰিমাণ আৰু প্ৰতি হেক্টৰত 8,800 জোপা গছ বতৰ, মাটিৰ অৱস্থা আৰু গছৰ বিকাশ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাই লোৱা হয়"

• একাকীকৃত পোকৰ ব্যৱস্থাপনা



- » পোকপতঙ্গ নিৰীক্ষণ আৰু বহুত পৰিমাণৰ জালত ধৰিবলৈ ষ্টিকি ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক।
- » ফল-মূলৰ মাখিৰ বাবে ছুইট ট্ৰেপ, বেছিল এক্সট্ৰেক্ট ট্ৰেপ বা ফেৰো মোনে ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰক



সংক্ৰামণ বিয়পা ৰোধ কৰিবলৈ ৰোগীয়া গছ, পুৰণা শস্য আৰু অপতৃণবোৰ আঁতৰ কৰক বা নষ্ট কৰি পেলাওক।



শস্যৱৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে।

• একীকৃত পতঙ্গ ব্যৱস্থাপনা আৰু সুৰক্ষিত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ।

- » প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ৰোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ(এমঅ'এ) গ্ৰুপ
- » সদায় কীটনাশক দ্ৰব্যৰ লেবেল আৰু ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্য পঢ়িব (পঞ্জীকৃত শস্য আৰু পোকপতঙ্গ)



ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	থ্ৰিপচ	বগা পখিলা	এফিড	পলু	লিফমাইনাৰ	গুৰুকা	ফলৰ মাখি
লম্বদা-ছায়ালোপ্তন	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ডিনোতেফুৰন	4A	S	✓	✓	✓		✓		✓
স্পিনোছড	5	S				✓	✓		✓
স্পাইনেটোৰাম	5	SC				✓	✓		✓
স্পিনেটোৰাম	6	SC (সামান্য S)	✓			✓	✓	✓	
থিয়চাইক্ৰম অক্সলেট	14	SC	✓	✓	✓		✓		
ক্লোৰণ্টেনিলিপ্ৰ'লে	28	S				✓			
ফলুবেণ্ডিয়মিড	28	S				✓			✓
বচিলুছ থুৰিনজিনেছিছ	11A	C				✓			
অজাডিৰেচটিন (নীম আৰু)	UN	অজ্ঞাত	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; SC (পেট+ সম্পৰ্ক) ; S (প্ৰণালীবদ্ধ)



ক্ৰিয়াশীল উপকৰণ(এআই)	MoA	ক্ৰিয়া	মতামত	ডেম্পিং-অফ	পাউডাৰি মিলডেউ	গ্ৰেমি ষ্টেম ব্লাইট	ডাউনি মাইলডেউ	বেক্টেৰিয়াৰ ফলৰ ব্লটচ	বীজাণু
ক'পাৰ ভিত্তিত ভেক্টৰনাশক	M 01	P		✓	✓	✓	✓	✓	
ক্লোৰথালোনি	M 05	P		✓	✓	✓	✓	✓	
মনকোজেব	M 03	P		✓	✓	✓	✓	✓	
এজোষ্ট্ৰ'বিন	11	P + C	প্ৰতি শস্য চক্ৰত সৰ্বাধিক 4 বাৰ	✓	✓	✓	✓	✓	
প্ৰ'পামোকাৰ	28	P + C		✓	✓				
ছায়মোজনি	27	C	প্ৰতিৰোধক মিশ্ৰিত টেক্সট (ক্ল'ৰথালোনি বা মনকোজেব)	✓	✓				
মেটালক্সল	4	P + C	প্ৰতিৰোধকৰ উচ্চ ক্ষমতা (প্ৰতিটো ক্ষতত কেৱল 2বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব)	✓	✓				
বচিলিয়াছ ছাবটিলিছ	BM02	P		✓	✓	✓	✓	✓	

এফআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; P = প্ৰতিৰোধমূলক (যেতিয়ালৈকে ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়) , C = ৰোগনিবাৰক

- সুৰক্ষিত গিয়েৰ পৰিধান কৰক
- ভাল বতৰ
- ভাল নলী
- স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ধুৱ।



<https://growhow.eastwestseed.com>

*ইষ্ট-ৱেষ্ট ছীড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021। সৰ্ব স্বত্বলিপি সংৰক্ষিত।

ৰেগেনিডন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰ'কেমিকেলৰ পৰামৰ্শবোৰৰ বিকাশ কৰা হৈছে