



বাংলা

ফসল নির্দেশিকা বরবটি

• জমি প্রস্তুতি

- » সরু নালা, সেচ ও নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- » মাটির আর্দ্ধতা সংরক্ষণ এবং আগাছা বৃক্ষিকে ত্রাস করার জন্য জৈব বা প্লাস্টিক মালচ স্থাপন করা যেতে পারে।
- » বীজ বপনের পূর্বে মাচা স্থাপন করুন।
- » প্রতি হেক্টারে ২৬,৬০০ চারা (ফসলের জাত এবং মৌসুমের সাথে সমন্বয় করে)




• বীজবপন



» প্রতি গর্তে ২ টি করে বীজ বপন করুন এবং চারা যখন ১০ সেমি লম্বা হবে তখন ১ টি চারা তুলে পাতলা করে দিন



• সার প্রয়োগ



প্রতি হেস্টেরে চারার সংখ্যা ২৬,৬০০ এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত সারের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে
মৌসুম, মাটির অবস্থা এবং গাছের বৃদ্ধির ধরণ অনুসারে সার প্রয়োগ সমন্বয় করুন

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা



» পোকা-মাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আঠাঁলো ফাঁদ (হলুদ এবং নীল)
ব্যবহার করুন



সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে অসুস্থ চারা,
পুরনো শস্য এবং আগাছা অবশ্যই তুলে ফেলুন
এবং ধূংস করুন



শস্যচক্র পোকামাকড় এবং রোগ-বালাই
প্রতিরোধ করে এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ
করে

• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার

- » সহনশীলতা প্রতিরোধের জন্য বিকল্প এমওএ গ্রুপ ব্যবহার করুন।
- » সর্বদা কীটনাশকের ব্যবহারবিধি পড়ুন এবং যথাযথক্ষেত্রে ব্যবহার করুন (নিবন্ধিত ফসল এবং বালাই)।

পোকামাকড়ের ধরণ		থ্রিপস	জাব পোকা	সাদা মাছি	লীফ মাইনর	ফল ছিদ্রকারী লার্ভা	
সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	থ্রিপস	জাব পোকা	সাদা মাছি	লীফ মাইনর	ফল ছিদ্রকারী লার্ভা
ল্যান্ডো-সাইহালোথিন	3A	এস সি	✓	✓	✓	✓	✓
ডাইনোটেফ্যুরান	4A	এস	✓	✓	✓	✓	
স্পিনেলোসাদ	5	এস				✓	✓
স্পিনেল্টেরাম	5	এস সি				✓	✓
এ্যাবামেকটিন	6	এস (কিথিংৎ এস)	✓			✓	✓
থিওসাইক্লাম অক্সালেট	14	এস সি	✓	✓	✓	✓	
ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল	28	এস					✓
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	28	এস					✓
ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস	11A	সি					✓
অ্যাজাডিরেস্টিন (নিম নির্যাস)	UN	অজানা	✓	✓	✓	✓	✓

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) আইআরএসি অনুসারে; এস সি(পাকস্থলি + স্পর্শক); এস (সিস্টেমিক)

রোগের ধরণ		পাতায় দাগ রোগ	পাউডারি মিল্ডিউ	মরিচ রোগ	হলুদ মোজাইক ভাইরাস	
সক্রিয় উপাদান	এমওএ	কার্যকলাপ	পাতায় দাগ রোগ	পাউডারি মিল্ডিউ	মরিচ রোগ	হলুদ মোজাইক ভাইরাস
কগারমুক্ত হৃতাক্রমাশক	M 01	পি	✓	✓	✓	প্রতিরোধী জাত বা রোগমুক্ত চারা ব্যবহার করুন
ক্লোরোথালোনিল	M 05	পি	✓	✓	✓	
ম্যানকোজেব	M 03	পি	✓	✓	✓	
এ্যাজোক্সিস্ট্রেবিন	11	পি+সি	প্রতি শস্যচক্রে সর্বোচ্চ 8 বার	✓	✓	সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণ করুন
ব্যাসিলাস সাবটিলিস	BM02	পি		✓	✓	

কার্যপদ্ধতি (এমওএ) এফআরএসি অনুসারে; পি = প্রতিরোধমূলক (কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কার্যকর); সি = প্রতিকারমূলক

- সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করুন  ✓
- ভাল আবহাওয়া  ✓
- ভাল নোজল  ✓
- স্প্রে করার পরে ধূয়ে ফেলুন  ✓

সুরক্ষা সামগ্রী পরিধান করুন

ভাল আবহাওয়া

ভাল নোজল

স্প্রে করার পরে ধূয়ে ফেলুন



KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

ইস্ট-ওয়েস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক কপিরাইট্র কৃত © ২০২১। সকল স্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

ওয়াগেনিনগেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার সহযোগিতায় কৃষি-রাসায়নিক সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।