




# પાક માર્ગદર્શિકા ગલગોટા

## ખેતરની તૈયારી

- » તે વિશાળ નહેરને સિંચાઈ કરવાનું સરળ છે અને સિંચાઈ સારી છે
- » પ્રત્યારોપણ ૮-૧૦ દિવસ પછી જાફરી સ્થાપિત કરો
- » ૧૬,૬૬૦-૨૬,૬૬૦ છોડ / હેક્ટર (વિવિધ અને સિઝન પર આધાર રાખે છે)



GUJRATHI



પ્રત્યેક ૨ મીટર, પ્રત્યારોપણ પહેલાં જમીનમાં ૮૦ જી ૧૫:૧૫:૧૫ + ૩ કિલોનો ખાતર

૪૦ સે.મી.

૫૦ સે.મી.

૧ મીટર પહોળું, ૩૦ સે.મી. ઊંચું (સૂકા સિઝનમાં ૨૦ સે મી )

# • છોડ ની તૈયાર


મીડિયા તૈયાર કરો, ૧૦ મિનિટ ગરમ કરો, તેને સૂર્યપ્રકાશમાં મૂકો અને અડધા દિવસમાં મૂકો.




## વાવણી બીજ અને રક્ષણ છોડ



બીજનું કદ = ૨ બીજ



## ભેજ સમાન રાખો



સવારે


સાંજે

૧૦ લિટર પાણી + ૧૦-૧૫ગ્રામ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ;  
ઉભરતાના ૧૦ દિવસ પછી ભીની રોપાઓ  
(જો જરૂરી હોય તો)




૧૫-૨૦ દિવસ

પાણી ઘટાડે અને બપોર પછી મોડાના વાવેતર કરતા ૨-૩ દિવસ પહેલાં વધુ સૂર્ય છતી કરો



# ● ખાતર નાખવાનું




આગ્રહણીય ખાતરની રકમ પ્લાન્ટની રકમ, ૬૦૦ હેક્ટરની વસ્તી પર આધારિત છે

# ● વધુ તે કરો

ફેલાવો, બીમાર છોડ, જૂના પાક અને નીંદાણને અટકાવવા માટે દૂર કરવું અને નાશ કરવું આવશ્યક છે.

સલામત અને અસરકારક જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો



# સલામત અને અસરકારક જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરો



સુરક્ષિત ઉપયોગ કરો



સારા હવામાન



સારા નોઝેલ



છંટકાવ પછી સારી રીતે ધૂઓ

## કિડની ના પ્રકાર



1 થૂરેપ

2 માવા

3 વ્હાઈટફ્લાય

4 ઈયળ

5 લીકું ખાણાંધો

6 લાલ સ્પાઈડર નાનું

સક્રિય તત્વ	કારવાઈ સમૂહ	કિટ્સ માટે લક્ષ્ય	1 / 2 / 3	4	5	6
ફાઈબ્રોઓનિલ	2B	SC	☺		☺	
લિમ્ડા - સાયલોટ્રિન	3A	SC	☺	☺	☺	☺
દીનેતેપુરાન	4A	S	☺		☺	
થિઓમિથઓન	4A	S	☺			
ઇમિકાક્લોપ્રિડ	4A	S	☺			
સ્પિનોસાડો	5	S		☺	☺	
અબ્યામાક્ટ્રીન	6	SC (ઓછી પ્રક્ષેપ)		☺	☺	☺
થિઓનિઅસમ ઓક્સિલાઇટ	14	SC	☺		☺	
ક્લોરેથાનિલિપ્રોટ	28	S		☺		
ફ્લુબેન્ડિઓમાઇડ	28	S		☺		

MOA (કારવાઈ સમૂહ); SC(પેટ + ચર્મક); S (વિકસન મુજબ)

- » પ્રતિકાર વધારવા માટે અન્ય જૂથનો ઉપયોગ કરો
- » રોગમાંથી વાયરલ જંતુને સુરક્ષિત કરો
- » સંક્રમિત છોડ અને ફળો દૂર કરો અને નાશ કરો
- » સાંસ્કૃતિક પ્રણાલીઓ દ્વારા નિયંત્રિત બેક્ટેરિયલ વિલ્ટ અને દક્ષિણી નમાવવું ફૂગ

સક્રિય તત્વ	કારવાઈ સમૂહ	કિટ્સ માટે લક્ષ્ય	ટિપ્પણી કરો
ક્લોરોથાલોનીલ	પ્રતિબંધિત	બહુહેતુક	
માનકોઝેબ	પ્રતિબંધિત	બહુહેતુક	
એઝોકાસ્ટ્રોબિન	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	અલ્ટેનેરિઅન લીકું સ્પોટ પાવડરી માઇલ્ડ્યુ બોટ્રીટીસ ફૂલ ફૂગ	સિઝનમાં ૪ વખત ઉપયોગ કરો
ઇમ્પરોડીઆન	પ્રતિબંધિત + અસરકારક	અલ્ટેનેરિઅન લીકું સ્પોટ બોટ્રીટીસ ફૂલ ફૂગ	
કોપર-આધારિત ફૂંગિસીડ્સ	અસરકારક	બોટ્રીટીસ ફૂલ ફૂગ	

## રોગના પ્રકાર



બેક્ટેરિયલ નમાવવું



અલ્ટેનેરિઅન લીકું સ્પોટ



પાવડરી માઇલ્ડ્યુ



બોટ્રીટીસ ફૂલ ફૂગ

<http://guides.eastwestseed.com>

આ પાક માર્ગદર્શિકાની પુષ્ટિને ઇસ્ટ-વેસ્ટ બીજ જ્ઞાનાત્મક સાંકળનો ભાગ છે, © ૨૦૧૭ કોર્પોરાઈટિંગ - ઇસ્ટ-વેસ્ટ બીજ ફાઉન્ડેશન  
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

