



फसल लगाने की मार्गदर्शिका यार्ड लांग बीन

• खेत की जुताई और पुर्वतैयारी

- » सकरा मार्ग सिंचाई और जल निकासी में मदद करते हैं
- » जैविक अथवा प्लास्टिक मल्व को मिट्टी में नमी संरक्षित करने एवं खरपतवार नियंत्रण के लिये उपयुक्त किया जा सकता है।
- »।रोपाई से पहले टेलिस स्थापित करे
- » 26,600 पौधे प्रति हेक्टेयर (किस्म और मौसम के अनुसार बदलाव)



HINDI



2 मीटर के दायरे में 80 ग्राम 15:15:15 और 3 किलोग्राम गोबर खाद पौधे रोपाई के पहले डाले।

50 सेंटीमीटर

50 सेंटीमीटर

1 मीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर ऊंचा (शुष्क मौसम में 20 सेंटीमीटर)


• पौधे तयार करना



» 2 बीज प्रति अंतर पर लगाये ,जब पौधा 10 से .मी . हो जाये तो उसमे से एक पौधा दुसरे जगह लगाये



• खाद व्यवस्थापन



फसल में खाद की अनुशंसित मात्रा २६,६०० प्रति हेक्टेयर पौधों के लिये है।खाद का उपयोग मृदा स्थिति, मौसम एवं पौधे की बढ़वार के अनुसार समायोजित कर सकते हैं।

• एकीकृत कीट प्रबंधन



» स्टिकी ट्रेप का उपयोग कीटों की निगरानी व अधिक संख्या मे कीटों को पकड़ने के लिए करे।



रोगों के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये संक्रमित पौधों , पुराने पौधे एवं खरपतवार नष्ट कर दे व हटा दें।



फसल चक्रण करने से कीट और रोग रूकते है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है।

• एकीकृत कीट प्रबंधन एवं रसायनों का सावधानीपूर्वक उपयोग।

- » प्रतिरोधी क्षमता रोकने के लिये दुसरे कारवाई समूह रसायन उपयोग करे।
- » हमेशा कीटनाशक पर्चा पढे।

किटो के प्रकार



थ्रिप

माहु

माहु

लीफ माइनर

फली छेदक

क्रियाशील घटक	कारवाई की विधि	क्रिया	थ्रिप	माहु	माहु	लीफ माइनर	फली छेदक
ल्याम्डा - सायलोथ्रीन	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
डॅनोटोफुरान	4A	S	✓	✓	✓	✓	✓
स्पिनोसाड	5	S				✓	✓
स्पानेटोरम	5	SC				✓	✓
अबेकटीन	6	SC (अल्प)	✓			✓	✓
थॅयोसायलम ऑक्सिलटे	14	SC	✓	✓	✓	✓	
क्लोरानट्रानिलीप्रोल	28	S					✓
प्लुबेडाअमिड	28	S					✓
बैसीलस थुरानजैन्सिस	11A	C					✓
अजाडीराक्टीन(नीम अर्क)	UN	अनजान	✓	✓	✓	✓	✓

Mode of Action (MoA) =क्रिया की विधि ; SC (पेट + संपर्क); S (प्रणाली के अनुसार)

रोगो के प्रकार



पत्ती धब्बा

चूर्णीत आसित्ता

रतुआ

पिला विषाणू जन्य रोग

क्रियाशील घटक	कारवाई की विधि	क्रिया	टपिणी	पत्ती धब्बा	चूर्णीत आसित्ता	रतुआ	पिला विषाणू जन्य रोग
कॉपर आधारित फफूंदनाशी	M 01	P		✓	✓	✓	प्रतिरोधी किस्म अथवा रोगमुक्त पौधे का उपयोग करे।
क्लोरोथानॉल	M 05	P		✓	✓	✓	
मॅनकोझेब	M 03	P		✓	✓	✓	
आइोक्ससोबिन	11	P + C	एक फसल चक्र के लिये अधिकतम चार बार।	✓	✓	✓	कीट वेक्टर प्रबंध जैसे सफेदमक्खी।
बैसिलस सबटालिस	BM02	P		✓	✓		

Mode of Action (MoA) कारवाई की विधि ; P= प्रतिबंधित (जब तक लक्षण न दिखे तब तक प्रभावी), C=रोगनिवारक

- सुरक्षित इस्तेमाल करे
- अच्छा मौसम
- अच्छे नोज़झेल
- छिडकाव के बाद अच्छे से धोये।



KNOWLEDGE TRANSFER



<https://growhow.eastwestseed.com>

इस फसल मार्गदर्शिका की पुष्ठी ईस्ट-वेस्ट सीड फाउंडेशन की जानकारी शृंखला का भाग है, © 2021 कॉपीराइट - ईस्ट - वेस्ट सीड फाउंडेशन के पास सभी अधिकार सुरक्षित है। कृषि रसायनों की संस्तुति वागैनिंगेन यूनिवर्सिटी एवं अनुसंधान के सहयोग से विकसित किया गया है।