




पिक लागवड मार्गदर्शिका. फुल गोबी

मशागत आणि पूर्वतयारी.

- » अरुंद रस्त्यामुळे पाणी देण्यास व निचरा होण्यास मदत होते.
- » तण निवारण तसेच मुदेची आद्रता टिकवून ठेवण्यासाठी प्लास्टिक किंवा ऑर्गॅनिक मल्लिंगचा वापर करावा.
- » 26,600 झाडे / हेक्टर (प्रत्येक मौसमानुसार आणि झाडांच्या प्रकारानुसार झाडांची संख्या कमीजास्त करावी)



MARATHI




• रोप तयार करणे


- ◆ मेडिया तयार करणे , १० मिनिट तापवणे किंवा उन्हात अर्धा दिवस वळवणे.



- ◆ बियाणे पेरून/लावून संरक्षित जागी ठेवावेत.




बियाणे लागवड पाऊण इंच खोल करावी




खेळती हवा

- ◆ सतत ओलावा ठेवावा.




सकाळी



सायंकाळी






10 ली पाणी + 10- 15 ग्राम कॅल्शियम नायट्रेट ;
उगवून आल्यानंतर 10 दिवसांनी टाकावे
(गरज असल्यास)




14-21 दिवस

- ◆ नर्लागवडीपूर्वी 5 ते 7 दिवस आधी पाणी अंशतः कमी करून रोपांना भरपूर सूर्यप्रकाश देणे.



• खताचा वापर



वरील उपचार, रोपांची संख्या प्रति हेक्टर २६,६०० व रोपांना लागणारे योग्य पोषण यावर अवलंबून आहे. हंगामानुसार, मातीच्या स्थितीनुसार आणि रोपाच्या वाढीच्या स्थितीनुसार खताचे प्रमाण कमी जास्त करावे.

• एकात्मिक कीड व्यवस्थापन



- » किटाकांचे निरीक्षण करण्यासाठी चिकट सापळ्याचा वापर करा
- » सुरवंटासाठी गोड सापळे किंवा प्रकाश सापळे वापरा



कीड व रोग प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी स्वच्छता मोहीम पाळावी. व कीड / रोगग्रस्त पाने, फळे व झाड काढून नष्ट करावीत.



पीक फेरपालट साखळी कीड / रोग व जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आवश्यक.

• एकात्मिक कीट प्रबंधन आणि कीटकनाशकांचा सुरक्षित वापर

- » प्रतिकारशक्ती टाळण्यासाठी वैकल्पिक रसायने वापरावे
- » कीटकनाशकांवरील लेबल काळजीपूर्वक वाचा आणि वापर करा



क्रियाशील घटक.	मोवा	प्रतिबंधित	पांढरी माशी	मावा	अळी	डायमंड बॅक मोथ
ल्याम्डा - सायलोथ्रीन	3A	SC	✓	✓	✓	✓
डायनोटेफुरान	4A	S	✓	✓		
स्पिनोसॅड	5	S			✓	✓
स्पिनोटोरम	5	SC			✓	✓
अब्ज्याम्याक्टीन	6	SC (कमी अंतरप्रवाही)			✓	✓
थायोसायक्लेम ऑक्सलेट	14	SC	✓	✓		
क्लोरानट्रानिलीप्रोल	28	S			✓	✓
फ्लूबेंडीअमाईड	28	S			✓	✓
बॅसिलस थुरेंजिनीसीस	11A	C			✓	✓
अॅझिडिरेक्टिन(नीम अर्क)	UN	माहित नसलेले	✓	✓	✓	✓

आय आर ए सीकडून आलेल्या कृतीवर आधारित प्रकार (MoA); SC (पचन + स्पर्श); S (अंतरप्रवाही)



क्रियाशील घटक.	मोवा	प्रतिबंधित	बहुउद्देशीय	काळी सड	जीवाणूजन्य सड	पानावरील ठिबके	भुरीरोग
तांब्रयुक्त बुरशीनाशक	M 01	P	जीवाणूजन्य आजारासाठीच वापर करा. अतीवापर करू नका.	✓	✓	✓	✓
क्लोरोथालोनिल	M 05	P		निवारक स्प्रे नाही गादीवाफे, पिक फेरपालट किंवा साफसाफाई करून निवारण करू शकता सिंचन करताना ते खूप उंचावरून करणे टाळा.		✓	✓
मान्कोझेब	M 03	P				✓	✓
अझोक्सीस्ट्रोबिन	11	P + C	एका हंगामात जास्तीत जास्त चार वेळा वापरावे			✓	✓
प्रोपामोकाब्	28	P + C				✓	✓
सायमोक्झिनिल	27	C	प्रतिबंधात्मक (क्लोरोथोबोनिल किंवा मान्कोझेब) एकत्र करावे			✓	✓
मेटालेक्झील	4	P + C	प्रतिकार क्षमता वाढण्याची शक्यता (फक्त २ वेळा वापरावे)			✓	✓
बॅसिलस सबटीलीस	BM02	P		✓	✓		✓

Mode of Action (MoA) = क्रियेचा प्रकार; p = आजाराची लक्षण न आढळल्यास, c = रोगनिवारक

- सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी.
- चांगले हवामान.
- चांगले नोजल (तुषार)
- फवारणी नंतर हात धुवा.



<https://growhow.eastwestseed.com>

कॉपीराइट East 2021 ईस्ट-वेस्ट सीड फाउंडेशन द्वारे. सर्व हक्क राखीव.
वॅगनिंगन विद्यापिठ आणि संशोधन यांच्याकडून कृषीरसायनांच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.