




पिक लागवड मार्गदर्शिका पत्ता गोबी

• मशागत आणि पूर्वतयारी

- » अरुंद रस्त्यामुळे पाणी देण्यास व निचरा होण्यास मदत होते.
- » २६६०० झाडे / हेक्टर



MARATHI



• रोप तयार करणे

मेडिया तयार करणे , १० मिनिट तापवणे किंवा उन्हात अर्धा दिवस वाळवणे



१ ते २ भाग माती




१ भाग चांगले कुजलेले शेणखत




१ भाग वाळू किंवा भाताचा जळलेला भुसा




बियाणे लागवड करून ट्रे सुरक्षित जागी ठेवावेत



बियाणे लागवड पाऊण इंच खोल करावी



आवश्यकतेप्रमाणे ओलावा ठेवावा




सकाळी



सायंकाळी





१० ली पाणी + १० - १५ ग्राम कॉल्डिअम नायट्रेट ; उगवून आल्यानंतर १० दिवसांनी टाकावे. (गरज असल्यास)




१४-२१ दिवस

पुनर्लागवडीपूर्वी २ ते ३ दिवस पाणी अंशतः कमी करून रोपांना भरपूर सूर्यप्रकाश देणे



• खत व्यवस्थापन



वरील शिफारस ही हेक्टेरी २६६०० रोपांसाठी आहे.

• अधिक उत्पादनासाठी हे कराच

किडींचा व रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी स्वच्छता मोहीम सातत्याने पाळावी, आणि कीड व रोगग्रस्त पाने, फळे व झाड काढून नष्ट करावीत



• रासायनिक औषधींचा सुरक्षित व कार्यक्षम वापर

- 1  सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी
- 2  चांगले हवामान
- 3  योग्य नोझल
- 4  फवारणी नंतर अंधोळ करावी

किटक व कीटकांचे प्रकार



1 पांढरी माशी

2 मावा

3 अळी

4 चोकोनी पतंग

क्रियाशील घटक	कृतीचा प्रकार	लक्ष्य	1 / 2	3	4
फिप्रोनेल (Fipronil)	2B	पचन + स्पर्श	☞		
ल्याम्डा - सायलोथ्रीन (Lambda-cyhalothrin)	3A	पचन + स्पर्श	☞	☞	☞
डायनोटेपूरान (Dinotefuran)	4A	आंतरप्रवाही	☞		
थायोमिथाझोन (Thiamethoxam)	4A	आंतरप्रवाही	☞		
इमिडाक्लोप्रिड (Imidacloprid)	4A	आंतरप्रवाही	☞		
स्पिनोसॅड (Spinosad)	5	आंतरप्रवाही		☞	
अब्जाम्याक्टीन (Abamectin)	6	पचन + स्पर्श (कमी आंतरप्रवाही)		☞	
थॅयोसायक्लेम ऑक्सिलेट (Thiocyclam oxalate)	14	पचन + स्पर्श	☞		
क्लोरांनिलीप्रोले (Chlorantraniliprole)	28	आंतरप्रवाही		☞	☞
फ्लूबेंडीआमाईड (Flubendiamide)	28	आंतरप्रवाही		☞	☞

- » प्रतिकारशक्ती टाळण्यासाठी वैकल्पिक रसायने वापरावे
- » लागवडीपासून ४० दिवसानंतर फवारण्या कमी कराव्यात
- » लॅक रॉट (जीवाणू) प्रतिबंधक उपायाने नियंत्रित करणे आवश्यक आहे (फवारणी प्रभावी नाही)

क्रियाशील घटक	कृतीचा प्रकार	लक्ष्य	प्रतिक्रिया
क्लोरोथालोनील (Chlorothalonil)	प्रतिबंधित	बहुपयोगी	
मान्कोझेब (Mancozeb)	प्रतिबंधित	बहुपयोगी	
अझोक्सिस्ट्रोबीन (Azoxystrobin)	प्रतिबंधित + बहुउद्देशीय	पानावरील ठिबके	एका हंगामात जास्तीत जास्त चार वेळा वापरावे
प्रोपामोकार्ब (Propamocarb)	प्रतिबंधित + बहुउद्देशीय	केवडा	
आयप्रॉडिऑन (Iprodione)	प्रतिबंधित + बहुउद्देशीय	पानावरील ठिबके	

रोगांचे प्रकार



काळी सड

पानावरील ठिबके

केवडा

<http://guides.eastwestseed.com>

ह्या पीक मार्गदर्शिकेतील शिफारस ईस्ट - वेस्ट सीड फौन्डेशन माहिती श्रृंखलेचा भाग आहे. © 2017 कॉपीराइट - ईस्ट - वेस्ट सीड फौन्डेशन .सर्व हक्क सुरक्षित .
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research