

EAST-WEST SEED
FOUNDATIONKNOWLEDGE
TRANSFER

पिक लागवड मार्गदर्शिका. मिरची

• मशागत आणि पूर्वतयारी.

- » अरुंद रस्त्यामुळे पाणी देण्यास व निचरा होण्यास मदत होते.
- » तण निवारण तसेच मृदेची आद्रता टिकवून ठेवण्यासाठी प्लास्टिक किंवा ऑर्गॅनिक मल्लिंगचा वापर करावा
- » लागवडीनंतर ८ ते १० दिवसांनी बांधणी/आधार देण
- » 26,600 झाडे / हेक्टर (प्रत्येक मौसमानुसार आणि झाडांच्या प्रकारानुसार झाडांची संख्या कमीजास्त करावी)



MARATHI



गादीवाफ्यावर प्रत्येकी 2 मी. ला 3 किलो कुजलेले शेणखत व 60 ग्रॅम 15:15:15 मिसळावे.

50 से.मी

50 से.मी

1 मी. रुंद, 30 सें.मी.उंच (उन्हाळ्यात 20 सें.मी.उंच वाफा)

•रोप तयार करणे

- ◆ मेडिया तयार करणे , १० मिनिट तापवणे किंवा उन्हात अर्धा दिवस वळवणे.



=1 to 2 parts soil




1 भाग चांगले कुजलेले शेणखत




1 भाग वाळू किंवा भाताचा जळलेला भुसा




- ◆ बियाणे पेरून/लावून संरक्षित जागी ठेवावेत.



बियाणे लागवड पाऊण इंच खोल करावी




- ◆ सतत ओलावा ठेवावा.




सकाळी




सायंकाळी



- ◆ नर्लागवडीपूर्वी 5 ते 7 दिवस आधी पाणी अंशतः कमी करून रोपांना भरपूर सूर्यप्रकाश देणे.



• खताचा वापर



वरील उपचार, रोपांची संख्या प्रति हेक्टर २६,६०० व रोपांना लागणारे योग्य पोषण यावर अवलंबून आहे. हंगामानुसार, मातीच्या स्थितीनुसार आणि रोपाच्या वाढीच्या स्थितीनुसार खताचे प्रमाण कमी जास्त करावे.

• एकात्मिक कीड व्यवस्थापन



» किटाकांचे निरीक्षण करण्यासाठी चिकट सापळ्याचा वापर करा



कीड व रोग प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी स्वच्छता मोहीम पाळावी. व कीड / रोगग्रस्त पाने, फळे व झाड काढून नष्ट करावीत.



पीक फेरपालट साखळी कीड / रोग व जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आवश्यक.

• एकात्मिक कीट प्रबंधन आणि कीटकनाशकांचा सुरक्षित वापर

- » प्रतिकारशक्ती टाळण्यासाठी वैकल्पिक रसायने वापरावे
- » कीटकनाशकांवरील लेबल काळजीपूर्वक वाचा आणि वापर करा



क्रियाशील घटक.	मोवा	प्रतिबंधित	तुडतुडे	पांढरी माशी	मावा	लाल कोळी	अळी
ल्याम्डा - सायलोप्रिन	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
डायनोटेफुरान	4A	S	✓	✓	✓		
स्पिनोसॅड	5	S					✓
स्पिनोटोरम	5	SC					✓
अब्याम्याक्टीन	6	SC (थोडे S)	✓			✓	✓
थायोसायक्लेम ऑक्सलेट	14	SC	✓	✓	✓		
क्लोरानट्रानिलीप्रोल	28	S					✓
फ्लूबेंडीअमाईड	28	S					✓
बॅसिलस थुरेंजिनीसीस	11A	C					✓
अॅझिडिरेक्टिन(नीम अर्क)	UN	माहित नसलेले	✓	✓	✓	✓	✓

आय आर ए सीकडून आलेल्या कृतीवर आधारित प्रकार(MoA); SC (पचन + स्पर्श); S (अंतरप्रवाही)



क्रियाशील घटक.	मोवा	प्रतिबंधित	बहुउद्देशीय	भुरीरोग	पानांवरील डाग	भुरी रोग	जीवाणूजन्य डाग	जीवाणूजन्य मर	विषाणूजन्य
तांब्रयुक्त बुरशीनाशक	M 01	P	जीवाणूजन्य आजारासाठीच वापर करा. अटीवापर करू नका.	✓	✓	✓	✓	✓	
क्लोरोथालोनील	M 05	P		✓	✓	✓			
मान्कोझेब	M 03	P		✓	✓	✓			
अझोक्सीस्ट्रोबिन	11	P + C	एका हंगामात जास्तीत जास्त चार वेळा वापरावे	✓	✓	✓			
बॅसिलस सबटीलीस	BM02	P		✓	✓	✓	✓	✓	
									निरोगी रोप वापरा

Mode of Action (MoA) = क्रियेचा प्रकार; p = आजाराची लक्षण न आढळल्यास, c = रोगनिवारक

- सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी.
- चांगले हवामान.
- चांगले नोजल (तुषार)
- फवारणी नंतर हात धुवा.



<https://growhow.eastwestseed.com>

कॉपीराइट East 2021 ईस्ट-वेस्ट सीड फाउंडेशन द्वारे. सर्व हक्क राखीव.
वॅगनिंगन विद्यापिठ आणि संशोधन यांच्याकडून कृषीरसायनांच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.