



पिक लागवड मार्गदर्शिका फरसबी (फ्रेंच बिन्स)

• मशागत आणि पूर्वतयारी.

- » अरुंद रस्त्यामुळे पाणी देण्यास व निचरा होण्यास मदत होते.
- » तण निवारण तसेच मुदेची आद्रता टिकवून ठेवण्यासाठी प्लास्टिक किंवा ऑर्गनिक मल्लिंगचा वापर करावा.
- » लागवडी अगोदार मंडप करावा
- » 26,600 झाडे / हेक्टर (प्रत्येक मौसमानुसार आणि झाडांच्या प्रकारानुसार झाडांची संख्या कमीजास्त करावी)



MARATHI



• लागवड




» प्रत्येक जागेवर २ बियाणे लावावे व नंतर १ झाड १० सें.मी. झाल्यानंतर उपटून टाकावे.



2 सें.मी.खोल

7 दिवस

• खताचा वापर



वरील उपचार, रोपांची संख्या प्रति हेक्टर २६,६०० व रोपांना लागणारे योग्य पोषण यावर अवलंबून आहे. हंगामानुसार, मातीच्या स्थितीनुसार आणि रोपांच्या वाढीच्या स्थितीनुसार खताचे प्रमाण कमी जास्त करावे.

• एकात्मिक कीड व्यवस्थापन



» किटाकांचे निरीक्षण करण्यासाठी चिकट सापळ्याचा वापर करा



कीड व रोग प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी स्वच्छता मोहीम पाळावी. व कीड / रोगग्रस्त पाने, फळे व झाड काढून नष्ट करावीत.



पीक फेरपालट साखळी कीड / रोग व जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आवश्यक.

• एकात्मिक कीट प्रबंधन आणि कीटकनाशकांचा सुरक्षित वापर

- » प्रतिकारशक्ती टाळण्यासाठी वैकल्पिक रसायने वापरावे
- » कीटकनाशकांवरील लेबल काळजीपूर्वक वाचा आणि वापर करा

कीटक व कीटकांचे प्रकार.



तुडतुडे

मावा

पांढरी माशी

नागअळी

शेंग अळी

क्रियाशील घटक	MoA	प्रतिबंधित	तुडतुडे	मावा	पांढरी माशी	नागअळी	शेंग अळी
ल्याम्डा - सायलोथ्रीन	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
डायनोटेफुरान	4A	S	✓	✓	✓	✓	✓
स्पिनोसॅड	5	S				✓	✓
स्पिनोटोरम	5	SC				✓	✓
अब्याम्याक्टीन	6	SC (थोडे S)	✓			✓	✓
थायोसायक्लेम ऑक्सलेट	14	SC	✓	✓	✓	✓	✓
क्लोरानट्रानिलीप्रोल	28	S					✓
फ्लूबेंडीअमाईड	28	S					✓
बॅसिलस थुरेंजिनीसीस	11A	C					✓
अॅझिडिरेक्टिन(नीम अर्क)	UN	माहित नसलेले	✓	✓	✓	✓	✓

आय आर ए सीकडून आलेल्या कृतीवर आधारित प्रकार(MoA); SC (पचन + स्पर्श); S (अंतरप्रवाही)

रोगांचे प्रकार



पानांवरील डाग

भुरी रोग

तांबेरा

यलो मोझॅक जिवाणू

क्रियाशील घटक	MoA	प्रतिबंधित	बहुउद्देशीय	पानांवरील डाग	भुरी रोग	तांबेरा	यलो मोझॅक जिवाणू
तांब्रयुक्त बुरशीनाशक	M 01	P		✓	✓	✓	निरोगी रोप वापरा
क्लोरोथालोनील	M 05	P		✓	✓	✓	मावा, पांढरी माशी
मान्कोझेब	M 03	P		✓	✓	✓	यासारख्या फळकृमीसारखे कीट प्रबंधन करत
अझोक्सीस्ट्रोबिन	11	P + C	एका हंगामात जास्तीत जास्त चार वेळा वापरावे	✓	✓	✓	
बॅसिलस सबटीलीस	BM02	P		✓	✓		

Mode of Action (MoA) =क्रियेचा प्रकार; p = आजाराची लक्षण न आढळल्यास, c = रोगनिवारक

1



सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी.

2



चांगले हवामान

3



चांगले नोजल (तुषार)

4



फवारणी नंतर हात धुवा.



KNOWLEDGE TRANSFER



<https://growhow.eastwestseed.com>

कॉपीराइट East 2021 ईस्ट-वेस्ट सीड फाउंडेशन द्वारे. सर्व हक्क राखीव.
वॅगनिंगन विद्यापिठ आणि संशोधन यांच्याकडून कृषीरसायनांच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

