



KNOWLEDGE
TRANSFER


पिक लागवड मार्गदर्शिका. मधूमका

• मशागत आणि पूर्वतयारी.

- » अरुंद रस्त्यामुळे पाणी देण्यास व निचरा होण्यास मदत होते.
- » 45,500 झाडे / हेक्टर (पिकाचा वाण आणि हंगाम यावरती अवलंबून)



MARATHI



गादीवाफ्यावर प्रत्येकी 2 मी. ला 3 किलो कुजलेले शेणखत व 50 ग्रॅम 15:15:15 मिसळावे.

30 से.मी

50 से.मी

1 मी. रुंद, 30 सें.मी.उंच (उन्हाळ्यात 20 सें.मी.उंच वाफा)


• लागवड



- » प्रत्येक जागी १-२ बियाणे लावा. उत्तम दर्जाचे कणसांसाठी प्रत्येक जागेवर्ती १० सें.मी.च्या उंचीनंतर खराब झाड काढून टाकावे
- » प्रत्येक जागेवर्ती एक बी लावा , मोकळ्या जागेवर्ती रोपवाटिका तयार करा



• खताचा वापर



वरील उपचार, रोपांची संख्या प्रति हेक्टर २६,६०० व रोपांना लागणारे योग्य पोषण यावर अवलंबून आहे. हंगामानुसार, मातीच्या स्थितीनुसार आणि रोपाच्या वाढीच्या स्थितीनुसार खताचे प्रमाण कमी जास्त करावे.

• Integrated Pest Management



- » किटाकांचे निरीक्षण करण्यासाठी चिकट सापळ्याचा वापर करा



कीड व रोग प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी स्वच्छता मोहीम पाळावी. व कीड / रोगग्रस्त पाने , फळे व झाड काढून नष्ट करावीत.



पीक फेरपालट साखळी कीड / रोग व जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आवश्यक.

• एकात्मिक कीट प्रबंधन आणि कीटकनाशकांचा सुरक्षित वापर

- » प्रतिकारशक्ती टाळण्यासाठी वैकल्पिक रसायने वापरावे
- » कीटकनाशकांवरील लेबल काळजीपूर्वक वाचा आणि वापर करा

किटक व कीटकांचे प्रकार.



मावा

अळी

क्रियाशील घटक.	मोवा	प्रतिबंधित	मावा	अळी
ल्याम्डा - सायलोथ्रीन	3A	SC	✓	✓
डायनोटेफुरान	4A	S	✓	
स्पिनोसॅड	5	S		✓
स्पिनोटोरम	5	SC		✓
अब्याम्याक्टीन	6	SC (थोडे S)		✓
थायोसायक्लेम ऑक्सलेट	14	SC	✓	
क्लोरानट्रानिलीप्रोल	28	S		✓
फ्लूबेन्डीअमाईड	28	S		✓
बॅसिलस थुरेंजिनीसीस	11A	C		✓
अॅडिरेक्टिन(नीम अर्क)	UN	माहित नसलेले	✓	✓

आय आर ए सीकडून आलेल्या कृतीवर आधारित प्रकार(MoA); SC (पचन + स्पर्श); S (अंतरप्रवाही)

रोगांचे प्रकार



तांबेरा

जिवाणू

भुरीरोग

क्रियाशील घटक.	मोवा	प्रतिबंधित	बहुउद्देशीय	तांबेरा	जिवाणू	भुरीरोग
तांब्रयुक्त बुरशीनाशक	M 01	P		✓	✓	✓
क्लोरोथालोनील	M 05	P		✓	✓	✓
मान्कोझेब	M 03	P		✓	✓	✓
अझोक्सीस्ट्रोबिन	11	P + C	एका हंगामात जास्तीत जास्त चार वेळा वापरावे	✓	✓	✓
प्रोपामोकाब्	28	P + C			✓	✓
सायमोक्झिनिल	27	C	प्रतिबंधात्मक (क्लोरोथोबोनिल किंवा मान्कोझेब) एकत्र करावे			✓
मेटालेक्झील	4	P + C	प्रतिकार क्षमता वाढण्याची शक्यता (फक्त २ वेळा वापरावे)			✓
बॅसिलस सबटीलीस	BM02	P			✓	✓

Mode of Action (MoA) = क्रियेचा प्रकार; p = आजाराची लक्षण न आढळल्यास, c = रोगनिवारक

1



सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी.

2



चांगले हवामान.

3



चांगले नोजल (तुषार)

4



फवारणी नंतर हात धुवा.



KNOWLEDGE TRANSFER



<https://growhow.eastwestseed.com>

कॉपीराइट East 2021 ईस्ट-वेस्ट सीड फाउंडेशन द्वारे. सर्व हक्क राखीव.
वॅगनिंगन विद्यापिठ आणि संशोधन यांच्याकडून कृषीरसायनांच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

