




ଫସଲ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ କାକୁଡ଼ି



ODIA

• ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି

- >> ଡୁଡ଼ା ମଝିରେ ସବୁ ନାଲି/ସିରା କଲେ ତାହା ଜଳ ସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
- >> ଚାବା ରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାତା/ମଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
- >> ହେକଟର ପ୍ରତି ୧୨୨୦୦ ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରେ



ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତି ୨ ମିଟର ରେ ୩ କେ.ଜି ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ୧୫: ୧୫:୧୫ ସାର ୬୦ ଗ୍ରାମ ମିଶାନ୍ତୁ

୫୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର

୫୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର

୧ ମିଟର ଚୌଡ଼ା, ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ବେଡ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ (୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଶୁଷ୍କ ରବୁରେ)




• ତାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି


ମିଢ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା : ୧୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ କରିବା ନଚେତ ଅଧା ଦିନ ପାଇଁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଓ ଟ୍ରେ ରେ ଭରିବା



ମଞ୍ଜି ରୋଇବା ଓ ତାରା ର ଯତ୍ନ ନେବା




ମଞ୍ଜି ରୋଇବାର ଗଭୀରତା: ୨ ଟି ମଞ୍ଜିର ମାପ




ତାରା ସମୟରେ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହିବ ଦରକାର



ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୨-୩ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମ ପାଣି ଓ ଅଧିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ



• ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ



• ଅଧିକା ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ

ରୋଗ ଯୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜମିକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ



• ଯଠିକ ପରିମାଣ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଯଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ



ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସୁରେ କରନ୍ତୁ



ପବନ ବୋହୁଥିବା ଦିଗରୁ ସୁରେ କରନ୍ତୁ



ଉଲ୍ଲ ନୋଡ଼ଏଲ



ସୁରେ କରିପାରିଲା ପରେ ସୁରେ ମେସିନ, ଦେହ ହାତ କୁ ଉଲ୍ଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ

କୀଟ ର ପ୍ରକାର

1 ଥ୍ରୀପ୍ସ

2 ଧଳା ମାଛି

3 ଏସିଡ଼

4 କୀଟବିଲ୍ଲୁର

5 ଲିଟ୍ଟା ମାଲମ୍

6 ଗୋବର ପୋକ

କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	1	2	3	4	5	6
ଡିପ୍ରୋନିଲ (Fipronil)	2B	SC	୫				୫	
ଲମ୍ବଡା-ସାଇହାଲୋଥ୍ରୀନ (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	୫			୫		୫
ଡାଇନୋଟେଫୁରାନ (Dinotefuran)	4A	S	୫				୫	
ଥାଇମେଥୋକ୍ସାମ (Thiamethoxam)	4A	S	୫					
ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ (Imidacloprid)	4A	S	୫					
ସ୍ପିନୋସାଡ଼ (Spinosad)	5	S				୫		
ଆବାମେକ୍ଟିନ (Abamectin)	6	SC (କିମି S)				୫		୫
ଥାଇଓସାଇକ୍ଲୋକ୍ସାଲେଟ୍ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	୫				୫	
କ୍ଲୋରାନ୍ତ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ (Chlorantraniliprole)	28	S						
ଫ୍ଲୁବେନ୍ଡିଆମାଇଡ଼ (Flubendiamide)	28	S						

MOA (କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର); SC (ଆକସ୍ମିକୀ + ସଂସର୍ଗ); S (ଶରୀରର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ)

- >> ଅଦଳ ବଦଳ କରି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
- >> ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୈଷକ ପୋକକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ
- >> ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଥିବା ଖରାପ ଗଛ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର କୁ ଦୂରରେ ପୋତିଦେବେ କିମ୍ବା ପୋତିଦେବେ
- >> ଗଛ ଲଗାଇବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ କୀଟନାଶକ କମ କରନ୍ତୁ

କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ	କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକାର	କୀଟ ର ଲକ୍ଷ	ମାତ୍ରତା
କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ (Chlorothalonil)	ନିବାରକ	ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ	
ମାଙ୍କଜେବ (Mancozeb)	ନିବାରକ	ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ	
ଆକ୍ସୋସ୍ତ୍ରୋବିନ (Azoxystrobin)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ପାର୍ଶ୍ଵଶିଆ ରୋଗ ଆକ୍ଟିଭାକ୍ସୋଲ୍	ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅତି ବେଶାରେ ୪ ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ସାଇମୋକ୍ସିପ୍ରୋକ୍ସିମ (Azoxystrobin)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ଦାଉନି ମିଲ୍ଡିଓ	
ପ୍ରୋପାମୋକାର୍ବ (Propamocarb)	ରୋଗନାଶକ	ଦାଉନି ମିଲ୍ଡିଓ	ବ୍ୟାଢ଼ି ରେ ନିବାରକ ମିଶାଇ (କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ ନତେତ ମାଙ୍କଜେବ)
ମେଟାଲକ୍ସିଲ୍ (Metalaxyl)	ନିବାରକ + ରୋଗନାଶକ	ଦାଉନି ମିଲ୍ଡିଓ	ଗୋଟେ ଉତ୍ତରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ସୁରେ କରନ୍ତୁ

ରୋଗ ର ପ୍ରକାର



ଆକ୍ଟିଭାକ୍ସୋଲ୍



ପାର୍ଶ୍ଵଶିଆ ରୋଗ



ଦାଉନି ମିଲ୍ଡିଓ



ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ

<http://www.eastwestseed-kt.com/>

ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଗ୍ରହସ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅବଦାନ ଏକ ଅଂଶ. @ ୨୦୧୭ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କ୍ଲବ୍ ପ୍ରୋଡ଼କ୍ଟସ୍ ଓ ଆରକ୍ଷିତ.

Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

