





పంట మార్గనిర్దేశం కాలిఫ్లవర్

• నేల నిర్వహణ

- » సాగు నీరు మరియు మురుగు నీరు పవహించడానికి తక్కువ వైశాల్యం కలిగిన కాలువ ఉండాలి
- » మట్టి తేమను సంరక్షించడం కొరకు మరియు కలుపు ఎదుగుదలను కనిష్టం చేయడం కొరకు సేంద్రియ లేదా ప్లాస్టిక్ మల్చ్ ని ఇన్ ప్లాల్ చేయవచ్చు
- » 26,600 మొక్కలు/హా (వైవిధ్యం మరియు సీజన్ కు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయండి)



TELUGU



• నారు మొక్కల ఉత్పత్తి

- నారును పెంచడానికి మట్టిని తయారుచేయటం: 10 నిమిషముల పాటు వేడి చేయాలి లేదా అర పూట ఎండలో ఉంచాలి: తే ను నింపాలి




1 నుండి 2 భాగాల మట్టి





1 భాగం బాగా కుళ్ళిన సేంద్రీయ ఎరువు




1 భాగం ఇసుక లేదా కార్బనికర్సాం చెందిన పరి ఉక




విత్తనాలను విత్తి మరియు నారును జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి




వీతై లోతు = 2 విత్తనాల పరిమాణం



- ఎప్పుడు తేమగా ఉండేట్లు చూసుకోవాలి




ఉదయం



సాయంత్రం




మొలక బయటికి వచ్చిన 10 రోజుల తర్వాత 10 లీ నీరు + 10-15 గ్రా కాలిషయమ్ నైట్రేట్ తో డ్రైచింగ్ చేయాలి (అవసరమైతే)




14-21 రోజులు

- నాటడానికి 5-7 రోజుల ముందు నీటి ఎద్దడి కి గురి చేసి ఎండలో ఉంచి సాయంత్రం పూట నాటాలి



• ఎరువులు వేయుట




"పంట అనుకూల పోషక ఆవశ్యకత మరియు హెక్టారుకు 8,800 మొక్కల జనాభా ఆధారంగా సిఫారసు చేయబడ్డ మొత్తం. సీజన్, మట్టి పరిస్థితులు మరియు మొక్క ఎదుగుదల స్థితిని బట్టి అప్లికేషన్ ని సర్దుబాటు చేయండి. "

• సమాకలిత తెగులు నివారణ



- » కీటకాల చీడలను మానిటర్ చేయడానికి మరియు సామూహికట్రాప్ చేయడానికి స్ట్రిక్కి టాప్ లను ఉపయోగించండి.
- » తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి, అస్వస్థతగా ఉన్న మొక్కలు, పాత పంటలు మరియు కలుపును తొలగించి నాశనం చేయాలి.



తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి, అస్వస్థతగా ఉన్న మొక్కలు, పాత పంటలు మరియు కలుపును తొలగించి నాశనం చేయాలి.



పంట మార్పిడి కీటకాలు మరియు వ్యాధులను నిర్మించకుండా నిరోధిస్తుంది మరియు మట్టి సంతానోత్పత్తిని పునరుద్ధరిస్తుంది

• సమాకలిత తెగులు నివారణ మరియు పురుగుమందుల యొక్క సురక్షిత ఉపయోగం

- » నిరోధాన్ని నిరోధించడం కొరకు ప్రత్యామ్నాయ MoA గ్రూపులు
- » ఎల్లప్పుడూ పురుగుమందుల లేబుల్ మరియు ఉద్దేశించబడిన ఉపయోగం (నమోదు చేయబడిన పంట మరియు చీడ) చదవండి.




క్రియాశీల	MoA	చర్య	తెల్ల దోమ	పేను బంక	గొంగళిపురుగు	డైమెండ్ బ్యాక్ మొత్
లంబడ-సైహలోథౌన్	3A	SC	✓	✓	✓	✓
డినోటెఫ్తరన్	4A	S	✓	✓		
స్పినోసాడ్	5	S			✓	✓
స్పైన్ టోరామ్	5	SC			✓	✓
అబమెక్టిన్	6	SC (స్వల్ప S)			✓	✓
తయోసిక్లాం ఆకులలేట్	14	SC	✓	✓		
క్లోరోథ్రినిలిప్రోల్	28	S			✓	✓
ఫ్లబెండిఅమిడ్	28	S			✓	✓
బాసిల్లస్ తురింగియెన్సిస్	11A	C			✓	✓
అజాదిరాఫ్తాన్ (వేప సారం)	UN	తెలియని	✓	✓	✓	✓

IRAC నుంచి చార్మిధానం (MoA); SC (కడుపు + పరిచయం); S (డైపిక)



క్రియాశీల	MoA	చర్య	వ్యాఖ్యలు	నల్ల వికలన	బాక్టీరియల్ సాఫ్ట్ రాట్	అల్టర్నెరియా లీఫ్ స్పాట్	బుజు తెగులు
రాగి ఆధారిత శిలీంత్తనాశినులు	M 01	P	"బాక్టీరియా వ్యాధుల కొరకు: అవసరమైనప్పుడు ప్రూతమే ఉపయోగించండి; సంభావ్య నిరోధం ఏర్పడకుండా నిరోధించడానికి అతిగా ఉపయోగించవద్దు"	✓	✓	✓	✓
ఖొరొథలోనిల్	M 05	P		సమర్థవంతమైన పనిచేసే పీచికార్ లేదు.		✓	✓
మన్నోజెబ్	M 03	P				✓	✓
అజోక్సి స్ట్రోబిన్	11	P + C	పంట జీవితకాలంలో గరిష్టంగా 4 సార్లు	Mబెడ్ పెంచడం, పంట మార్పిడి మరియు పారిశుధ్యం వంటి నివారణ చర్యలతో నిర్వహించండి.		✓	✓
ప్రోపామోక్రోప్	28	P + C					✓
సైమోస్టెనిల్	27	C	ట్యాంక్ ని నివారణ (క్రోథలోనిల్ లేదా మాంకోజెబ్) తో కలపడం	అధిక నీటి పారుదల నిర్వహించండి			✓
మెటలాసైల్	4	P + C	నిరోధకత్వం యొక్క అధిక ప్రమాదం (ప్రతి సీజన్ కు 2 సార్లు మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది)				✓
బాసిల్లస్ సబ్ టిలిస్	BM02	P		✓	✓		✓

FRAC నుంచి చర్మవిధానం (MoA); P = నివారణ (వ్యాధి లక్షణాలు ఇంకా కనిపించనప్పుడు మాత్రమే సమర్థవంతమైనది), IC = నివారణ



హాని చేయకుండా రక్షన కల్పించే దుస్తులను దరించాలి మంచి వాతావరణం మంచి నోజ్ స్వయం చేసిన తర్వాత కడగాలి



<https://growhow.eastwestseed.com>
 కాపీరైట్ ©2021 ద్వారా ఈస్ట్-వెస్ట్ సీడ్ ఫౌండేషన్. అనిష్టాకులు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. వాగ్నింగెన్ విశ్వవిద్యాలయం మరియు పరిశోధన సహకారంతో వ్యవసాయ రసాయన సిఫార్సులు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి