




పంట మార్గనిర్దేశం బంతి పువ్వు

• నేల నిర్వహణ

- » సాగు నీరు మరియు మురుగు నీరు ప్రవహించడనికి తక్కువ వెశాల్యం కలిగిన కాలువ ఉండాలి
- » మట్టి తేమను సంరక్షించడం కొరకు మరియు కలుపు ఎదుగుదలను కనిష్టం చేయడం కొరకు సేంద్రియ లేదా ప్లాస్టిక్ మల్చ్ ని ఇన్ ప్లాల్ చేయవచ్చు.
- » నాటిన 8 నుండి 10 రోజుల తర్వాత మొక్కలు పాకడనికీ తీగలు కట్టాలి
- » 16,660-33,330 మొక్కలు/హా (వెవిధ్యం మరియు సీజన్ కు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయండి)




TELUGU





• నారు మొక్కల ఉత్పత్తి


- నారును పెంచడానికి మట్టిని తయారుచేయటం: 10 నిమిషముల పాటు వేడి చేయాలి లేదా అర పూట ఎండలో ఉంచాలి: తే ను నింపాలి





విత్తనాలను విత్తి మరియు నారును జ్రాగత్తగా చూసుకోవాలి



వీతె లోతు = 2 విత్తనాల పరిమాణం




- ఎప్పుడు తేమగా ఉండేట్లు చూసుకోవాలి



ఉదయం


సాయంత్రం

మొలక బయటికి వచ్చిన 10 రోజుల తర్వాత 10 లీ నీరు + 10-15 గా కాల్షియమ్ నైట్రేట్ తో డ్రెంచింగ్ చేయాలి (అవసరమే)




15-20 రోజులు

- నాటడానికి 2-3 రోజుల ముందు నీటి ఎద్దడి కి గురి చేసి ఎండలో ఉంచి సాయంత్రం పూట నాటాలి




• ఎరువులు వేయుట



"పంట అనుకూల పోషక ఆవశ్యకత మరియు హెక్టారుకు 8,800 మొక్కల జనాభా ఆధారంగా సిఫారసు చేయబడ్డ మొత్తం. సీజన్, మట్టి పరిస్థితులు మరియు మొక్క ఎదుగుదల స్థితిని బట్టి అప్లికేషన్ ని సర్దుబాటు చేయండి. "



» కీటకాల చీడలను మానిటర్ చేయడానికి మరియు సామూహికట్రాప్ చేయడానికి ప్రిక్కి టాప్ లను ఉపయోగించండి.



తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి, అస్వస్థతగా ఉన్న మొక్కలు, పాత పంటలు మరియు కలుపును తొలగించి నాశనం చేయాలి.

నారు నటిన 10-12 రోజుల తరవాత చిగురులను కత్తిరించలి తెదా 5వ నోడె పెన మొత్తం దుసివెయలి



పంట మార్పిడి కీటకాలు మరియు వ్యాధులను నిర్మించకుండా నిరోధిస్తుంది మరియు మట్టి సంతానోత్పత్తిని పునరుద్ధరిస్తుంది

• సమాకలిత తెగులు నివారణ మరియు పురుగుమందుల యొక్క సురక్షిత ఉపయోగం

- » నిరోధాన్ని నిరోధించడం కొరకు ప్రత్యామ్నాయ MoA గ్రూపులు
- » ఎల్లప్పుడూ పురుగుమందుల లేబుల్ మరియు ఉద్దేశించబడిన ఉపయోగం (నమోదు చేయబడిన పంట మరియు చీడ) చదవండి.



క్రియాశీల	MoA	చర్య	పేను బంక	తెల్ల దోమ	గొంగళిపురుగు	టుటా అబ్సొలుటా	ఎరుపు సాలీడు పేనుపురుగులు
లంబడ-సెహలోథున్	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
డినోటెథ్రిన్	4A	S	✓	✓		✓	
స్పినోసాడ్	5	S			✓	✓	
స్పెన్ టోరామ్	5	SC			✓	✓	
అబమెక్టిన్	6	SC (స్వల్ప S)			✓	✓	✓
తయోసిక్లాం ఆకులలేట్	14	SC	✓	✓		✓	
క్లోరంథ్రనిలిప్రోల్	28	S			✓		
ఫ్లబెండిమిడ్	28	S			✓		
బాసిల్స్ తురింగియెన్సిస్	11A	C			✓		
ఆజాదిరాప్టాన్ (వేప సారం)	UN	తెలియని	✓	✓	✓	✓	✓

IRAC నుంచి చారిత్రాధానం (MoA); SC (కడుపు + పరిచయం); S (దెహిక)



క్రియాశీల	MoA	చర్య	వ్యాఖ్యలు	బాక్టీరియల్ విల్ట్	ఆల్టర్నేరియా ఆకు మచ్చ	భుడిద తెగులు	బోరిస్ పువ్వు ముడుత
రాగి ఆధారిత - శిలీంధ్రనాశినులు	M 01	P	బాక్టీరియా వ్యాధుల కొరకు: అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించండి. సంభావ్య నిరోధం ఏర్పడకుండా నిరోధించడానికి అతిగా ఉపయోగించవద్దు	✓	✓	✓	✓
క్లోరోథలోని	M 05	P		నిరోధక రకాలు లేదా	✓	✓	✓
మాంకోజెబ్	M 03	P		వ్యాధులు లేని నారును ఉప	✓	✓	✓
అబొక్స్ ట్రైబిన్	11	P + C	పంట జీవితకాలంలో గరిష్టంగా 4 సార్లు		✓	✓	✓
బాసిల్స్ సబ్ టెలిస్	BM02	P		✓		✓	✓

FRAC నుంచి చారిత్రాధానం (MoA); P = నివారణ (వ్యాధి లక్షణాలు ఇంకా కనిపించనప్పుడూ మాత్రమే సమర్థవంతమైనది), IC = నివారణ

1. హాని చేయకుండా రక్షణ కల్పించే దుస్తులను దరించాలి
2. మంచి వాతావరణం
3. మంచి నోజ్
4. స్ప్రయ్ చేసిన తర్వాత కడగాలి



<https://growhow.eastwestseed.com>

© 2021 ద్వారా ఈస్ట్-వెస్ట్ సీడ్ ఫౌండేషన్. అనిష్టాకులు రిజర్వేయబడ్డాయి. వాగెనింగెన్ విశ్వవిద్యాలయం మరియు పరిశోధన సహకారంతో వ్యవసాయ రసాయన సిఫార్సులు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి