



KNOWLEDGE
TRANSFER

పంట మార్గనిర్దేశం బొప్పాయి

• నేల నిర్వహణ

- » నీరు నిల్వ కాకుండా కాలువలు ఉండాలి
- » మట్టి తేమను సంరక్షించడం కొరకు మరియు కలుపు ఎదుగుదలను కనిష్టం చేయడం కొరకు
- » సేంద్రియ లేదా ప్లాస్టిక్ మల్చ్ ని ఇన్ ప్లాల్ చేయవచ్చు.
- » 1,100 -1,340 మొక్కలు/హా (రకానికి అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయండి)



TELUGU



• ముందు అంకురొత్పత్తి మరియు విత్తనాల ఉత్పత్తి


- నరుని పెంచే విధానం: 10 నిమిషాలపాటు వేడి చేయండి లేదా సగం రోజు పూర్తి ఎండలో ఉంచండి, తరువాత టేని నింపండి.



1 నుండి 2 భాగాల మట్టి



1 భాగం బాగా కుళ్ళిన సెండ్రెయి ఎరువు



1 భాగం ఇసుక లేదా కార్బనిక్ టర్ఫ్ చేరిన పరి ఉక




ఎంపిక 1:

- విత్తనాలను 1 లీటరు నీటిలో నానబెట్టండి
- 100 గాముల పొటాషియం నైట్రేట్ తో (13-0-44) 30 నిమిషాలు
- నానబెట్టిన వెంటనే విత్తుకోవాలి

ఎంపిక 2:

- విత్తనాలను 3-5 రోజులు నానబెట్టండి,
- పతరరేఖా నీటిని మార్చడం

- విత్తనాలను విత్తి మరియు నారును జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి



- పాలిథిలీన్ సంచులలో బదిలీ చేయండి
- విత్తిన 14 రోజుల తర్వాత (DAS)
- కాల్షియం నైట్రేట్ లేదా 15-15-15 (40 mg/16 ఎల్ ఎస్) తర్వాత

- కుడించుము
- అంతరాన్ని సర్దుబాటు చేయండి (10 cm x 10 cm) 14 రోజుల తర్వాత

వీక్షే లోతు = 2 విత్తనాల పరిమాణం

- రోజంతా నిరంతర తేమ నిర్వహించు



ఉదయం

సాయంత్రం




45-48 రోజులు

- నాటడానికి 5-7 రోజుల ముందు నీటి ఎద్దడి కి గురి చేసి ఎండలో ఉంచి సామ్యంతం పూట నాటాలి




సామ్యంతం పూట నాటాలి మరియు నాటిన తరువాత నీళ్ళు వేయాలి

• ఎరువుల అనువర్తనం(అప్లికేషన్)



"పంట అనుకూల పోషక ఆవశ్యకత మరియు హెక్టారుకు 8,800 మొక్కల జనాభా ఆధారంగా సిఫారసు చేయబడ్డ మొత్తం. సీజన్, మట్టి పరిస్థితులు మరియు మొక్క ఎదుగుదల స్థితిని బట్టి అప్లికేషన్ ని సర్దుబాటు చేయండి. "

• కోత మరియు కోత అనంతర అభ్యాసం



నాటిన 6-7 నెలలు తర్వాత పండు దిగుబడి వస్తుంది



9ఉదయం నుండి 3 మధ్యాహ్నం మధ్యపంట



పండును మెత్తటి ప్రాతలో ఉంచండి

- సమాకలీత తెగులు నివారణ మరియు పురుగుమందుల యొక్క సురక్షిత ఉపయోగం



ప్రభుత్వం పై కొరకు స్క్విడ్ టాప్, తులసి ఎక్స్ ప్రెస్ టాప్ లేదా ఫెరోమోన్ ట్రాప్ ఉపయోగించండి.

* నిరోధాన్ని నిరోధించడం కొరకు ప్రత్యామ్నాయ MoA గ్రూపులు

* ఎల్లప్పుడూ పురుగుమందుల లేబుల్ మరియు ఉద్దేశించబడిన ఉపయోగం (నమోదు చేయబడిన పంట మరియు చీడ) చదవండి.



వివిధ రకాల
హాని కలగజేసే
క్రీటకాలు



క్రియాశీల	MoA	చర్య	తల్ల దోష	పేను బంక	మీలీబగ్	రెడ్ సైడర్ ప్రైట్స్ ను సే పురుగులు	
లంబడ-సైహల్థస్	3A	SC	✓	✓	✓	✓	
డిస్ కెపురన్	4A	S	✓	✓	✓		✓
స్పిన్ సడీ	5	S			✓		✓
సైన్ బోరామ్	5	SC			✓		✓
అబమెక్సీన్	6	SC (స్వల్ప S)				✓	
తయోసిక్వం ఆకులరేబ్	14	SC	✓	✓			
క్లోరంథనిలిప్రోల్	28	S					
ఫ్లబెండిఆమిడ్	28	S					✓
బాస్మిల్స్ తురింగియెన్సిస్	11A	C					
అజాదిరాధిన (వేప సారం)	UN	తలియని	✓	✓	✓	✓	✓

IRAC నుంచి చారిత్రాధానం (MoA); SC (కడుపు + పరిచయం); S (ద్రాపిక)

వ్యాధుల
రకాలు



క్రియాశీల	MoA	చర్య	వాస్తవ్యాలు	దంపింగ్-ఆఫ్	దీప బ్యాక్	వైరస్
రాగి ఆధారిత శిలీంధ్రనాశినియ	M 01	P	రాజ్గిరిలో బ్యాంకు కార్యకర్తల అనుసరణనున్నది ప్రాథమిక అవయోగంపండు. సంబంధించిన నిర్దేశం ప్రకారం నిర్దేశించబడిన అవయోగంపండు	✓	✓	
ఖాళీగాలిని	M 05	P		✓		
మన్యుజీవ	M 03	P		✓		
అక్షాక్షి (స్ట్రోబిన్)	11	P + C	ప్రతి వంట పైకిలే కు గలన్నంగా 4 నార్లు	✓		
అక్షాక్షాక్షి	28	P + C		✓		
ప్రముఖుని	27	C	అక్షాక్షి ని పిండుడే అక్షాక్షిని లేని పానీయం లే కలపడం	✓		
మెటానా	4	P + C	నిర్దేశించబడిన అక్షాక్షి ప్రముఖం ప్రతి పిండు కు 2 నార్లు ప్రాథమిక అవయోగంపండు	✓		
అక్షాక్షిని పక్షి అక్షాక్షి	BM02	P		✓		

FRAC నుంచి చరఫీధానం (MoA); P = నివారణ (వ్యాధి లక్షణాలు ఇంకా కనిపించనప్పుడు మాత్రమే సమర్థవంతమైనది), IC = నివారణ



<https://growhow.eastwestseed.com>

జనవరి 2021 ద్వారా తప్పింపు సేవ పొందినవారి అవస్థాత్మకంగా రిపోర్ట్ చేయబడ్డాయి. వాగింగ్స్ పేర్లపై పరిశీలన మరియు పరిశీలన సమాచారం వ్యవసాయ రూపం సాధారణంగా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి.

