



పంట మార్గనిర్దేశం కర్పూజ

• నేల నిర్వహణ

- » సాగు నీరు మరియు మురుగు నీరు పవహించడానికి తక్కువ వెశాల్యం కలిగిన కాలువ ఉండాలి
- » మట్టి తేమను సంరక్షించడం కొరకు మరియు కలుపు ఎదుగుదలను కనిష్టం చేయడం కొరకు సేంద్రియ లేదా ప్లాస్టిక్ మల్చ్ ని ఇన్ స్టాల్ చేయవచ్చు.
- » నారు నాటే ముందు టెల్లిస్ ను సంస్థాపన చేయండి
- » 26,600 మొక్కలు/హా (వెవిధ్యం మరియు సీజన్ కు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయండి)



TELEGU



• నారు మొక్కల ఉత్పత్తి


- నారును పెంచడానికి మట్టిని తయారుచేయటం: 10 నిమిషముల పాటు వేడి చేయాలి లేదా అర పూట ఎండలో ఉంచాలి: తే ను నెంపాలి




- విత్తనాలను విత్తి మరియు నారును జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి




- ఎప్పుడు తేమగా ఉండేట్లు చూసుకోవాలి



- నాటడానికి 2-3 రోజుల ముందు నీటి ఎద్దడి కి గురి చేసి ఎండలో ఉంచి సాయంత్రం పూట నాటాలి



• ఎరువులు వేయుట




"పంట అనుకూల పోషక ఆవశ్యకత మరియు హెక్టారుకు 8,800 మొక్కల జనాభా ఆధారంగా సిఫారసు చేయబడ్డ మొత్తం. సీజన్, మట్టి పరిస్థితులు మరియు మొక్క ఎదుగుదల స్థితిని బట్టి అప్లికేషన్ ని సర్దుబాటు చేయండి. "

• సమాకలిత తెగులు నివారణ



- » కీటకాల చీడలను మానిటర్ చేయడానికి మరియు సామూహికట్రాప్ చేయడానికి స్ట్రిక్కి టాప్ లను ఉపయోగించండి.
- » తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి, అస్వస్థతగా ఉన్న మొక్కలు, పాత పంటలు మరియు కలుపును తొలగించి నాశనం చేయాలి.



తెగులు వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడానికి, అస్వస్థతగా ఉన్న మొక్కలు, పాత పంటలు మరియు కలుపును తొలగించి నాశనం చేయాలి.



పంట మార్పిడి కీటకాలు మరియు వ్యాధులను నిర్మించకుండా నిరోధిస్తుంది మరియు మట్టి సంతానోత్పత్తిని పునరుద్ధరిస్తుంది

సమాకలిత తెగులు నివారణ మరియు పురుగుమందుల యొక్క సురక్షిత ఉపయోగం

- » నిరోధాన్ని నిరోధించడం కొరకు ప్రత్యామ్నాయ MoA గ్రూపులు
- » ఎల్లప్పుడూ పురుగుమందుల లేబుల్ మరియు ఉద్దేశించబడిన ఉపయోగం (నమోదు చేయబడిన పంట మరియు చీడ) చదవండి.




క్రియాశీల	MoA	చర్య	తామర పురుగు	పెను బంక	తెల్ల దోమ	గొంగలి పురుగు	ప్రత హరిత పురుగు	బీటీల్	పండు ఈగ
లంబడ-సెహలోథున్	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
డినోటెపురన్	4A	S	✓	✓	✓		✓		✓
స్పిన్సెడ్	5	S				✓	✓		✓
స్పెన్ బోరామ్	5	SC				✓	✓		✓
అబమెక్టిన్	6	SC (స్వల్ప S)	✓			✓	✓	✓	
తయోసిక్లాం ఆకులలేట్	14	SC	✓	✓	✓		✓		
క్లోరంథ్రనిలిప్రోల్	28	S				✓			
ఫ్లబెండిఅమిడ్	28	S				✓			✓
బాసిల్లస్ తురింగియెన్సిస్	11A	C				✓			
ఆజాదిరాఫ్టాన్ (వేప సారం)	UN	తెలియని	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IRAC నుంచి చార్యవిధానం (MoA); SC (కడుపు + పరిచయం); S (దెహిక)



క్రియాశీల	MoA	చర్య	వ్యాఖ్యలు	డంపింగ్ ఆఫ్	నూగుత్ క పుబడిన తెగులు	జిగట కాండం తెగులు	బూడిద తెగులు	బాక్టీరియాల పండు మచ్చ	వెరన్
రాగి ఆధారిత శిలీంధ్రనాశినులు	M 01	P		✓	✓	✓	✓	✓	
ఖ్లోరోథలోనిల్	M 05	P		✓	✓	✓	✓		
మన్నోజెబ్	M 03	P	పంట జీవితకాలంలో గరిష్ఠంగా 4 సార్లు	✓	✓	✓	✓		
అజోక్సి స్ట్రోబిన్	11	P + C		✓	✓	✓	✓		
ప్రోపామోక్స్	28	P + C	ట్యాంక్ ని నివారణ (క్లోరోథలోనిల్ లేదా మ్యాంకోజెబ్) తో కలపడం	✓	✓				
సెమెస్కనిల్	27	C	నిరోధకత యొక్క అధిక ప్రమాదం (ప్రతి సీజన్ కు 2 సార్లు మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది)	✓	✓				
మెటలాసెల్	4	P + C		✓	✓				
బాసిల్లస్ సబ్ టిలిస్	BM02	P		✓	✓	✓	✓	✓	

FRAC నుంచి చర్యవిధానం (MoA); P = నివారణ (వ్యాధి లక్షణాలు ఇంకా కనిపించనప్పుడు మాత్రమే సమర్థవంతమైనది), C = నివారణ



హాని చేయకుండా రక్షన కల్పించే దుస్తులను దరించాలి

మంచి వాతావరణం

మంచి నోజ్

స్నాయ్ చేసిన తర్వాత కడగాలి



<https://growhow.eastwestseed.com>

కాపీరైట్ ©2021 ద్వారా ఈస్ట్-వెస్ట్ సీడ్ ఫౌండేషన్. అనిష్టాకులు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. వాగ్దానింగ్ విశ్వవిద్యాలయం మరియు పరిశోధన సహకారంతో వ్యవసాయ రసాయన సిఫార్సులు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి