



KNOWLEDGE
TRANSFER


ការណែនាំអំពីដំណាំ ដំណាំម្ទេសហ៊ុរ

• ការរៀបចំដី

- » ត្រូវមានចន្លោះរងគ្រឹមត្រូវ ដើម្បីជួយដល់ការបញ្ចេញ និងបញ្ចូលទឹក។
- » ការប្រើសារធាតុសរីរាង្គ ឬការប្រើកៅស៊ូគ្របរងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីរក្សាសំណើមដី និងកាត់បន្ថយការដុះលូតលាស់ស្មៅ
- » បន្ទាប់ពីដាំបាន ៨ ទៅ ១០ ថ្ងៃ ត្រូវបោះបង្គោលឡើងអោយបានល្អ
- » ២៦៦០០ដើម ក្នុងមួយហិកតា (អាស្រ័យលើប្រភេទពូជ និងរដូវកាលដាំដុះ)



CAMBODIA



មុនពេលដាំត្រូវប្រើដីទ្រាប់បាត១៥-១៥-១៥ ចំនួន ៦០ក្រាម និងជីលាមកសត្វ ចំនួន ៣គីឡូក្រាម បាចទៅលើផ្ទៃដីរងដំណាំប្រវែង ២ម៉ែត្រ។

ចន្លោះគុម្ព ៥០ សង់ទីម៉ែត្រ

ចន្លោះរង៥០ សង់ទីម៉ែត្រ

ទទឹងរង ១ម៉ែត្រ និងកំពស់រង ៣០សង់ទីម៉ែត្រ
(នៅរដូវប្រាំងកំពស់រង ២០ សង់ទីម៉ែត្រ)

• ការបណ្តុះកូនដំណាំ

- ♦ ការរៀបចំល្បាយដីបណ្តុះកូនដំណាំ (ត្រូវលើង ឬចម្អិនដី) ក្នុងរយៈពេល១០នាទី ឬ ដាក់ល្បាយដីបណ្តុះហាលកន្លះថ្ងៃ រួចទុកអោយត្រជាក់ ទើបដាក់ចូលក្នុងថាសបណ្តុះ



ដីដំបូក ១ ទៅ ២ ភាគ




លាមកសត្វ ១ ភាគ




ដីខ្សាច់ ឬធុរុងអង្កាម ១ភាគ



- ♦ ការសាបគ្រាប់ និងការការពារកូនដំណាំ




សាបគ្រាប់ជំងឺ ២ដងនៃទទឹងគ្រាប់



មានខ្យល់ចេញ
ចូលបានល្អ

- ♦ ពិនិត្យ និងរក្សាសំណើមអោយបានល្អ



ពេលព្រឹក





ពេលល្ងាច




២៥ ទៅ ២៨ ថ្ងៃ

លាយដីកាល់ស្យូមនីត្រាត ១០ ទៅ ១៥ក្រាម
ជាមួយទឹក ១០ លីត្រ បាញ់ទៅលើកូនដំណាំបន្ទាប់ពីដុះបាន ១០ថ្ងៃ (ប្រសិនបើចាំបាច់)

- ♦ ត្រូវកាត់បន្ថយការស្រោចទឹក និងដាក់កូនដំណាំអោយត្រូវនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ ៥ទៅ ៧ ថ្ងៃមុនពេលដាក់ដាំ ត្រូវដាំកូនដំណាំនៅពេលរសៀល



• ការដាក់ជីបំប៉ន



បរិមាណជីដែលណែនាំនេះ គឺផ្អែកលើចំនួនកូនដំណាំ ២៦៦០០ ដើមក្នុង១ហិកតា
ការដាក់ជីអាស្រ័យទៅលើរដូវកាល ស្ថានភាពដី និងស្ថានភាពដុះលូតលាស់របស់ដំណាំ

• ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ



» ប្រើអន្ទាក់ស្អិតដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងទាក់សត្វល្អិត



ដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺដល់ដំណាំ
ត្រូវសំអាតដំណាំចាស់ៗ ដំណាំដែលមានជំងឺ
និងស្មៅចង្រៃចេញ ដោយដុត ឬកប់ចោលអោយឆ្ងាយពីចំការ



ត្រូវដាំដំណាំបង្វិលដើម្បីការពារការកើតឡើងនូវសត្វល្អិតចង្រៃ
និងជំងឺ ហើយជួយកែលំអរដីអោយមានជីជាតិឡើងវិញ។

• ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម

- » បាញ់ថ្នាំឆ្លាស់ ដើម្បីបង្ការនូវភាពស៊ាំរបស់សត្វល្អិត
- » ត្រូវអានស្លាកសញ្ញា និងការណែនាំមុននឹងប្រើថ្នាំកសិកម្ម (មុខដំណាំ និងកត្តាចង្រៃ)



ធាតុសកម្ម	បែបផែនធាតុសកម្ម (MoA)	ភាពសកម្ម	ទ្រីប	រុយស	ចៃដន្យក្រូម	ពពួកពីងពាង	ពពួកដង្កូវ
ឡាម៉ា ស៊ីហាឡូទ្រីន (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ដាយណូទែរហ្វេន (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓		
ស្ទីនូសាត (Spinosad)	5	S					✓
ស្ទីណូរ៉ាម (Spinetoram)	5	SC					✓
អាបាមិកទីន (Abamectin)	6	SC (ជ្រាបចូលតិចតួច)	✓			✓	✓
អ៊ីសូស្ទាម អុកសាឡាត (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓		
ក្លរ៉ាន់ត្រានីលីប្រូល (Chlorantraniliprole)	28	S					✓
ហ្វ្លូបេនីយ៉ាមីដ (Flubendiamide)	28	S					✓
បាក់តេរីយ៉ា ប្រូនូស៊ីស (Bacillus thuringiensis)	11A	C					✓
អាហ្សាឌីនាក់ទីន (Azadirachtin (neem extract))	UN	មិនច្បាស់លាស់	✓	✓	✓	✓	✓

បែបផែនធាតុសកម្ម (MoA) ផ្អែកពីអាយរ៉ាក់ (IRAC) ; SC (តាមការលេបចូល និងប៉ះផ្ទាល់) ; S (តាមការជ្រាបចូល)



ធាតុសកម្ម	បែបផែនធាតុសកម្ម (MoA)	ភាពសកម្ម	កំណត់សំគាល់	ជំងឺផ្សិតអង្កាម	ជំងឺផ្សិតស្លេក	ជំងឺផ្សិតម្លៅ	ជំងឺបាក់តេរី	ជំងឺបាក់តេរី	ជំងឺវីរុស
ខ្នុបកី បេស ហ្វូនគីសាយ (Copper-based Fungicides)	M 01	P	ជំងឺបាក់តេរី ប្រើប្រាស់តាមការណែនាំ	✓	✓	✓	✓	✓	
ក្លរ៉ូតាលីនីល (Chlorothalonil)	M 05	P		✓	✓	✓			
ម៉ង់តូហ្សែប (Mancozeb)	M 03	P		✓	✓	✓			
អាសូស្ទ្រូប៊ីន (Azoxystrobin)	11	P + C	អប្បបរមា ៤៨០ក្រាមក្នុងមួយហិកតា	✓	✓	✓			
បាក់តេរីយ៉ា ប្រូនូស៊ីស (Bacillus subtilis)	BM02	P		✓	✓	✓	✓	✓	
									ប្រើប្រាស់តាមការណែនាំ

បែបផែនធាតុសកម្ម (MoA) ផ្អែកពីហ្វ្រាក់ (FRAC); P (គី) = បង្ការ (មានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលមិនមានធាតុសកម្មកើតឡើង) , C (ស៊ី) = ព្យាបាល

1. ស្លៀកពាក់ខោអាវការពារអោយបានត្រឹមត្រូវ
2. អាកាសធាតុល្អ
3. ក្បាលបាញ់សាច់ល្អ
4. លាងសំអាតសំភារៈបន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំ

<https://growhow.eastwestseed.com>

ការណែនាំអំពីដំណាំ គឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផលិតដោយ ផ្នែក EWSF ©2021 រក្សាសិទ្ធិច្បាស់លាស់ដោយផ្នែក East-West Seed Foundation គ្រប់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវរក្សាទុក។
ការផ្តល់អនុសាសន៍នីមួយៗត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្វេនីន (Wageningen University & Research)

