



ការណែនាំអំពេជ្យារំ ដំណរំសំណ្ងែកចាយ

- ការរៀបចំដី

- » ដាក់ដីឱ្យយកចំនួន ១តីឡូក្រាម, ដីត្រឹមបកលសុធបោះផ្លូវស្ថាត ២,៥ តីឡូក្រាម
និងដីបូតាសូម ២,៥ តីឡូក្រាម ក្នុងផ្ទៃដី៤០០ ម៉ែត្រការើ
ដោយត្រូវចូលទៅក្នុងដីមុនពេលសាប្តាប់
- » ២០០០០០ ទៅ ៣៥០០០ ដីមក្សានមួយហិចតា (សំរាប់ដីស្អុក) និង ៤០០០០០ ដីមក្សានមួយហិចតា (សំរាប់ដីមានការរោច្រាស)




CAMBODIA




• ការសាបត្រាប់



- » ដោកសាប ၁ត្រាប់ ផ្តុងទរណ៍ កណ្តែ ၁၀ស.ម អ្នក
- » ប្រសិនបើចាំបាច់ ត្រូវសាបម្អុនឡើងក្នុងអំឡុងពេល ၁៥ថ្ងៃ
- » លាយត្រាប់ពួកសំណើការ ၁គីឡូក្រាម តាមយក្សាំ
- Rhizobium ៤០ត្រាម មុនពេលសាបត្រាប់ (ថ្ងៃដី ៤០០ម៉ោគរាន់)
- ដើម្បីបង្កើនការកែតែវេក្ខជនបំពុសជំណាំ



• ក្រុមក្រសួង (ប្រសិនបើដឹងត្នានសំណើក្រុម) និង សំអាតស្សី



• ការគ្រប់គ្រងកត្តាចំង់



- » ប្រើអន្តាក់ស្ថិកដើម្បីគ្រកពិនិត្យ និងទាក់សញ្ញាលិត



ដើម្បីបង្ការការផ្តល់កកាលជាលជីជីជំណើលជាប់ជាលក់
ត្រូវសំអាតជំណាំចាត់សំរាប់ជំណើលជាប់ដែលមានជំនួយ
និងស្ម័គ្រោះដោយមុក បុរកប់ចោលអាយត្តាយពីចំការ



គ្រប់ជំណើលដើម្បីការពារការកែតែឡើងនូវសំគាល់លិតចំង់
និងជំនួយ ហើយធ្វើយកសំអាតដោយមានជំជាតិឡើងវិញ។


• ការគ្រប់គ្រងកត្តាចំពោះ និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្វាំកសិកម្ម

- » បានថ្វាំឆ្លាស់ ដើម្បីបង្ការនូវការពស់ស្តីពីកម្ម
- » ក្រែរអានស្សាកសញ្ញា និងការណែនាំមុននឹងប្រើប្រាស់ថ្វាំកសិកម្ម (មុខដំណាំ និងកត្តាចំពោះ)




ឈាមសក្តី	លេខរឿងឈាមសក្តី (MoA)	ការសក្តី	ប្រើប្រាស់	ប្រើប្រាស់	ប្រើប្រាស់	សក្តីពេជ្យ
ឡូកឈុំកុម្ភូឡូទីន (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓
តាយកុំទេមុយុយីដ (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓	
សុខុំសិរិ (Spinosad)	5	S				✓
សុខុំសិរិ (Spinetoram)	5	SC				✓
អាបាមិតិខិន (Abamectin)	6	SC (ប្រាបួលឯកធម្មិចកូច)	✓			✓
ធិមសុខាមុសាទ្វាម (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓	
ផ្លូវការឱ្យឱ្យ (Chlorantraniliprole)	28	S				✓
ឲ្យុយឈុំឱ្យ (Flubendiamide)	28	S				✓
បាក់គុម្ភុសុទ្វិនសុសុ (Bacillus thuringiensis)	11A	C				✓
អាហ្វីរីកិន (Azadirachtin (neem extract))	UN	មិនធ្វាស់លាស់	✓	✓	✓	✓

លេខរឿងឈាមសក្តី (MoA) ផ្លូវកិត្តិការយកកំ (IRAC) ; SC (តាមការលបច្ចុល និងប៉ែង្រាល់); S (តាមការរាបច្ចុល)



ឈាមសក្តី	លេខរឿងឈាមសក្តី (MoA)	ការសក្តី	កំណត់សកាល	ជីស្សិកការលើលើកកុម្ភូសិរិ ជីស្សិកឱ្យ	ជីស្សិកឱ្យ	ជីស្សិកឱ្យ	ជីស្សិកឱ្យ
ខុស់ លេស ហ្មុនិកិត្យ (Copper-based Fungicides)	M 01	P		✓	✓	✓	
ផ្លូវការឱ្យ (Chlorothalonil)	M 05	P		✓	✓	✓	
ម៉ែកុំព្យូទ័រ (Mancozeb)	M 03	P		✓	✓	✓	
កាសុកុំព្យូទ័រ (Azoxystrobin)	11	P + C	អូអូទាន ឈឺអូអូមុយអូអូកំ	✓	✓	✓	
ផ្លូវការឱ្យ (Propamocarb)	28	P + C					
សាយុកុំព្យូទ័រ (Cymoxanil)	27	C	សាយុកុំព្យូទ័រ ឈឺ ម៉ែកុំព្យូទ័រ (ផ្លូវការឱ្យ ឈឺ ម៉ែកុំព្យូទ័រ) ក្នុងក្នុងក្នុង				
មេកាយុកុំព្យូទ័រ (Metalaxy)	4	P + C	(ក្នុងក្នុងក្នុងក្នុង)				
បាក់គុម្ភុសកបីទឹក (Bacillus subtilis)	BMO2t	P		✓	✓		

លេខរឿងឈាមសក្តី (MoA) ផ្លូវកិត្តិការយក (FRAC); P (កី) =បង្ការ មានប្រសិទ្ធភាពនៃពេលដែលមិនមានឈាមសក្តីកៅតិវិធី, C(សី) = ព្យាពាល



ស្អែកពាក់ខោករការពាររាយបានព្រឹមប្រឈរ

អាកាសឈាមសក្តី

ក្នុងឈាមសក្តី

លាងសំភាពសំភារៈបន្ទាប់ពីបានថ្វាំប្រឈរ



EAST-WEST SEED
FOUNDATION

KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

ការពេទ្យអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊្រណ៍កម្មសាធារណ៍ការពេទ្យអភិវឌ្ឍន៍ EWSF ©2021 ក្នុងសិទ្ធិបច្ចេកទេសដោយ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊្រណ៍កម្មសាធារណ៍ការពេទ្យអភិវឌ្ឍន៍ East-West Seed Foundation ត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត។ ការប្រើប្រាស់នេះគឺជាផ្លូវការរាយការណ៍ និងសាស្ត្រ។ ការប្រើប្រាស់នេះអាចបានរាយការណ៍ និងសាស្ត្រ។ ការប្រើប្រាស់នេះគឺជាផ្លូវការរាយការណ៍ និងសាស្ត្រ។