



KNOWLEDGE
TRANSFER

ការណែនាំអំពីដំណាំ ដំណាំត្រប់

• ការរៀបចំដី

- » ត្រូវមានចន្លោះរងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជួយដល់ការបញ្ចេញ និងបញ្ចូលទឹក។
- » ការប្រើសារធាតុសរីរាង្គ ឬការប្រើកៅស៊ូគ្របរងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីរក្សាសំណើមដី និងកាត់បន្ថយការដុះលូតលាស់ស្មៅ
- » បន្ទាប់ពីដាំបាន ៨ ទៅ ១០ ថ្ងៃ ត្រូវបោះបង្គោលឡើងអោយបានល្អ
- » ១៧៧០០ដើម ក្នុងមួយហិកតា (អាស្រ័យលើប្រភេទពូជ និងរដូវកាលដាំដុះ)



CAMBODIA



មុនពេលដាំត្រូវប្រើដីទ្រាប់បាត១៥-១៥-១៥ ចំនួន ៦០ក្រាម និងជីលាមកសត្វ ចំនួន ៣គីឡូក្រាម បាចទៅលើផ្ទៃដីរងដំណាំប្រវែង ២ម៉ែត្រ។

ចន្លោះគុម្ព ៧៥ សង់ទីម៉ែត្រ

ចន្លោះរង៥០ សង់ទីម៉ែត្រcm

ទទឹងរង ១ម៉ែត្រ និងកំពស់រង ៣០សង់ទីម៉ែត្រ (នៅរដូវប្រាំងកំពស់រង ២០ សង់ទីម៉ែត្រ)

• ការបណ្តុះកូនដំណាំ

- ♦ ការរៀបចំល្បាយដីបណ្តុះកូនដំណាំ (ត្រូវលើង ឬចំហៀងដី) ក្នុងរយៈពេល១០នាទី ឬ ដាក់ល្បាយដីបណ្តុះហាលកន្លះថ្ងៃ រួចទុកអោយត្រជាក់ ទើបដាក់ចូលក្នុងថាសបណ្តុះ



ដីដំបូក ១ ទៅ ២ ភាគ




លាមកសត្វ ១ ភាគ




ដីខ្សាច់ ឬធុរុងអង្កាម ១ភាគ



- ♦ ការសាបគ្រាប់ និងការការពារកូនដំណាំ




សាបគ្រាប់ជំងឺ ២ដងនៃទទឹងគ្រាប់



មានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ


- ♦ ពិនិត្យ និងរក្សាសំណើមអោយបានល្អ



ពេលព្រឹក





ពេលល្ងាច




២៥ ទៅ ២៨ ថ្ងៃ

លាយដីកាល់ស្បែកនីត្រាត ១០ ទៅ ១៥ក្រាម ជាមួយទឹក ១០ លីត្រ បាញ់ទៅលើកូនដំណាំបន្ទាប់ពីដុះបាន ១០ថ្ងៃ (ប្រសិនបើចាំបាច់)

- ♦ ត្រូវកាត់បន្ថយការស្រោចទឹក និងដាក់កូនដំណាំអោយត្រូវនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ ៥ ទៅ ៧ ថ្ងៃមុនពេលដាក់ដាំ ត្រូវដាំកូនដំណាំនៅពេលរសៀល



• ការដាក់ដីបំប៉ន



បរិមាណដីដែលណែនាំនេះ គឺផ្អែកលើចំនួនកូនដំណាំ ១៧៧០០ ដើមក្នុង១ហិកតា
 ការដាក់ដីអាស្រ័យទៅលើរដូវកាល ស្ថានភាពដី និងស្ថានភាពដុះលូតលាស់របស់ដំណាំ

• ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ



- » ប្រើអន្ទាក់ស្លឹកដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងទាក់សត្វល្អិត
- » ប្រើអន្ទាក់ផ្អែម ឬអន្ទាក់ហ្វេរ៉ូម៉ូន (Pheromone) សម្រាប់ដង្កូវចោះត្រួយ និងផ្លែ



ដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺដល់ដំណាំ
 ត្រូវសំអាតដំណាំចាស់ៗ ដំណាំដែលមានជំងឺ
 និងស្មៅចង្រៃចេញ ដោយដុត ឬកប់ចោលអោយឆ្ងាយពីចំការ



ត្រូវដាំដំណាំបង្វិលដើម្បីការពារការកើតឡើងនូវសត្វល្អិតចង្រៃ
 និងជំងឺ ហើយជួយកែលំអរដីអោយមានជីជាតិឡើងវិញ។

• ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម

- » បាញ់ថ្នាំឆ្លាស់ ដើម្បីបង្ការនូវភាពស៊ាំរបស់សត្វល្អិត
- » ត្រូវអានស្លាកសញ្ញា និងការណែនាំមុននឹងប្រើថ្នាំកសិកម្ម (មុខដំណាំ និងកត្តាចង្រៃ)



ធាតុសកម្ម	បែបផែនធាតុសកម្ម (MoA)	ភាពសកម្ម	ទ្រីប	រុយស	តែជញ្ជក់ រុក្ខស	មមាចខៀវ	ពីងពាងក្រហម	អណ្តើក មាស	ពពួកដង្កូវ	ដង្កូវស្លឹកដើម និងផ្លែ	តែម្សៅ
ឡាម៉ា ស៊ីហាឡូទ្រីន (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ដាយណូទែរូយ៉េន (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓	✓					✓
ស្ទីនូសែត (Spinosad)	5	S							✓	✓	✓
ស្ទីណីតូរ៉ាម (Spinetoram)	5	SC							✓	✓	✓
អាបាមិកទីន (Abamectin)	6	SC (ជ្រាបចូលតិចតួច)	✓				✓	✓	✓	✓	
មីសូស៊ីតាម អុកសាឡាត (Thiocydiam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓	✓					
ក្លរ៉ាន់ត្រានីលីប្រូល (Chlorantraniliprole)	28	S							✓	✓	
ហ្វ្លុយបេនឌីយ៉ាមី (Flubendiamide)	28	S							✓	✓	
បាក់តេរីយ៉ា ថ្វីនហ្វ្រីនស៊ីស (Bacillus thuringiensis)	11A	C							✓	✓	
អាហ្សាឌីរាក់ទីន (Azadirachtin (neem extract))	UN	មិនច្បាស់លាស់	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

បែបផែនធាតុសកម្ម (MoA) ផ្អែកពីអាយរ៉ាក់ (IRAC) ; SC (តាមការលេបចូល និងប៉ះផ្ទាល់) ; S (តាមការជ្រាបចូល)



ធាតុសកម្ម	បែបផែនធាតុសកម្ម (MoA)	ភាពសកម្ម	កំណត់សំគាល់	ជំងឺបាក់តេរីស្រពោនស្រស់	ជំងឺផ្សិតក្រូច ទីញ្ឆ្ឆាវលូយដើម	ជំងឺផ្សិតក្រូច ទីញ្ឆ្ឆាវលូយដើម
គុប្រី បេស ហ្វូនដីសាយ (Copper-based Fungicides)	M 01	P	ជំងឺបាក់តេរី ប្រើថ្នាំតែនៅពេលដែលចាំបាច់ ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ ដើម្បីកុំឲ្យមានការស្លាប់កើតឡើង	✓		✓
ក្លរ៉ូតាលីនីល (Chlorothalonil)	M 05	P				✓
ម៉ង់កូសេប (Mancozeb)	M 03	P				✓
អាសូស៊ីត្រូប៊ីន (Azoxystrobin)	11	P+C	អប្បបរមា ៤ដងក្នុងមួយវដ្តដំណាំ		✓	✓
បាក់តេរីយ៉ា ថ្វីនហ្វ្រីនស៊ីស (Bacillus subtilis)	BM02	P		✓		
ត្រីកូដេរ៉ា (Trichoderma)	BM02	P			✓	

បែបផែនធាតុសកម្ម (MoA) ផ្អែកពីហ្វ្រាក់ (FRAC) ; P (កី) = បង្ការ (មានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលមិនមានរោគសញ្ញាកើតឡើង) , C(ស៊ី) = ព្យាបាល

- ស្លៀកពាក់ខោអាវការពារអោយបានត្រឹមត្រូវ
- អាកាសធាតុល្អ
- ក្បាលបាញ់សាច់ល្អ
- លាងសំអាតសំភារៈបន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំរួច

