



EAST-WEST SEED

សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ

ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេស


តើអ្វីជាសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ?

* សារធាតុចិញ្ចឹមដែលរុក្ខជាតិត្រូវការក្នុងបរិមាណច្រើនសំរាប់ការលូតលាស់។




CAMBODIA

រុក្ខជាតិត្រូវការសារធាតុ
ចិញ្ចឹមជាច្រើនទៀតក្រៅពីអាសូត (N) ។




បានពីខ្យល់
(សមាសភាគសម្ព័ន្ធ)

សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ ឬម៉ាក្រូធាតុ




សារធាតុចិញ្ចឹមដែលរុក្ខជាតិត្រូវការតិចតួច
ឬមីក្រូធាតុ



សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗទាំង ១៨មុខដែលរុក្ខជាតិត្រូវការ

• មុខងាររបស់សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗ



អាសូត (N)

- * ចូលរួមក្នុងស្នូលសំយោគ
- * ជំរុញការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ

ផូស្វ័រ (P)

- * ជំរុញការលូតលាស់របស់ឫស
- * ជំរុញភាពទុំ

ប៉ូតាស្យូម (K)

- * ធ្វើអោយផ្លែមានគុណភាពប្រសើរឡើង
- * បង្កើនការធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺ

ម៉ាញ៉េស្យូម (Mg)

- * គ្រប់គ្រងការស្រូបយកសារធាតុ ចិញ្ចឹមផ្សេងទៀត
- * ជាសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ក្នុងការផលិតក្លរ៉ូភីល (រុក្ខជាតិបៃតង)

ស្ថាន់ដ័រ (S)

- * ជំរុញការបង្កើតកំពកឫសលើដំណាំអំបូរ សណ្តែក
- * ជួយបង្កើនការលូតលាស់របស់ឫស និងបង្កើតគ្រាប់

កាល់ស្យូម (Ca)

- * បង្កើនការចេញផ្លែ
- * បង្កើនការធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺ

ប្រអប់គន្លឹះ៖

ការគ្រប់គ្រងទឹកបានល្អធានានូវការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិបាន ល្អ។

• រោគសញ្ញាកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម

ប្រអប់គន្លឹះ៖

រោគសញ្ញាអាចកើតមាននៅពេលរាំងស្ងួត រឺសង្វេគដោយថ្នាំគីមីកសិកម្ម ឬជម្ងឺ។ ប្រសិនបើមិនប្រាកដទេ សូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ។

ស្លឹក និងផ្លែនៅផ្នែកខាងលើ/ខ្ចី



កង្វះស្ពាន់ធីរ៖ ចាប់ផ្តើមលឿងដូចកង្វះអាសូត ប៉ុន្តែផ្តើមពីស្លឹកខ្ចី



កង្វះកាល់ស្យូម៖ រលួយនៅផ្នែកខាងក្រោមផ្លែ រលាកនៅគែមស្លឹក ស្លឹកថ្មីចេញមកខូចទ្រង់ទ្រាយ

ស្លឹកនៅផ្នែកខាងក្រោម/ចាស់



កង្វះប៊ូតាស្យូម៖ ចាប់ផ្តើមឡើងលឿងនៅគែមស្លឹក



កង្វះអាសូត៖ ចាប់ផ្តើមលឿងលើស្លឹក



កង្វះម៉ាញ៉េស្យូម៖ ចាប់ផ្តើមលឿងនៅចន្លោះទ្រនុងស្លឹក



កង្វះផូស្វ័រ៖ ចាប់ផ្តើមពណ៌ស្វាយលើស្លឹក



• ការគ្រប់គ្រងកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម



ធ្វើការពិនិត្យសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងដីជាទៀងទាត់ ដោយពិនិត្យរកមីលសារធាតុអាសូត (N) មុនរដូវកាលដាំដំណាំនីមួយៗ និងធ្វើការពិនិត្យរកមីលសារធាតុផូស្វ័រ (P) ប៉ូតាស្យូម (K) កាលស្យូម (Ca) ស្ថាន់ដេរ (S) ម៉ាញ៉េស្យូម (Mg) និង ប៊ែរ៉ាល់ (pH) រៀងរាល់៥ឆ្នាំម្តង។

ដាក់ដី បន្ថែមកំបោរប្រសិនបើដីមានប៊ែរ៉ាល់ (pH) ទាប ឬដីអាស៊ីត។ ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញ។

តំរូវនៃដីអស់រីកង្គ និង ដីសរីរាង្គដែលអាចរកបាន

ដីអស់រីកង្គ		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
ដីសមាស	NPK ១៥-១៥-១៥	១៥	១៥	១៥
	NPK ២០-២០-១៥	២០	២០	១៥
	NPK ១០-២៦-២៦	១០	២៦	២៦
ដីទ្វេធាតុ	ឌីអាម៉ូញ៉ូម ផូស្វាត (DAP)	១៨	៤៦	០
	អាម៉ូញ៉ូមផូស្វាត	១៦	២០	០
	ម៉ូណូប៉ូតាស្យូម ផូស្វាត	០	៥២	៣៤
ដីទោល	អ៊ុយរ៉េ	៤៦	០	០
	ប៉ូតាស្យូមក្លរួ	០	០	៦០
	ផូស្វាត	០	៣៦	០

*DAP ១០០គក គឺមិនស្មើនឹងអ៊ុយរ៉េ ១០០គកទេ
 *DAP ១០០គក មាន N(អាសូត) ១៨ គក និង P2O5 (ផូស្វ័រ) ៤៦គក
 *អ៊ុយរ៉េ ១០០គក មាន N (អាសូត) ៤៦គក

ដីសរីរាង្គ	
ដីឈាមកសត្វ	ដីឈាមកគោ ដីឈាមកបក្សី ដីឈាមកមាន់
កាកសំណល់រុក្ខជាតិ	ចំប៉ើង សណ្តែក ដើមពោត
ផ្សេងៗ	ដីអាចម៍ជន្លួន ដីបូកាលី កាល់ផូស (សំបកពងមាន់/ ឆ្អឹង) ការផ្លាស់ដីត្រី (FAA) ការផ្លាស់ដីពីផ្លែឈើ (FFJ) ការផ្លាស់ដីពីរុក្ខជាតិ (FPJ) ការចំរាញ់សារធាតុចិញ្ចឹម

