





វិច័ទ្ធសត្វល្អិត៣សំខាន់ៗ ចម្លងជំងឺវីរុសរុក្ខជាតិ ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេស

• តើហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវស្គាល់វិច័ទ្ធសត្វល្អិត ?



សត្វល្អិតតូចៗ

ការខូចខាតមិនប្រក្រតី
ដោយសារការចម្លងវីរុស



• តើអ្វីជាវិចទ័រសត្វល្អិត៣សំខាន់ៗចម្លងជំងឺវីរុសរុក្ខជាតិ ?

វិចទ័រសត្វល្អិត = សត្វល្អិតដែលអាចនាំយកជំងឺវីរុសពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀត។

វីរុសរុក្ខជាតិ = មីក្រូសរីរាង្គដែលបណ្តាលអោយមានការចម្លងមេរោគដល់រុក្ខជាតិ ។



ពពួកចៃជញ្ជក់ក្រវាស់



រុយស



ទ្រីប

• រោគសញ្ញាទូទៅនៃការបំផ្លាញ



រូញស្លឹកដោយសារការបំផ្លាញដោយក្រវាស់រុក្ខជាតិ។



កើតមានផ្សិតប្រេងភ្លើងដោយសារតែការបញ្ចេញចោលទឹកដមពីពពួកចៃជញ្ជក់ក្រវាស់ និងរុយស។



ស្លាកស្នាមពណ៌ប្រាក់នៅលើស្លឹកដោយសារការបំផ្លាញពីទ្រីប ។

• តើវិចទ័រសត្វល្អិតបញ្ជូនមេរោគវីរុសបានយ៉ាងដូចម្តេច ?



ចំណាំ: រុក្ខជាតិខ្ចី (ដំណាក់កាលសំណាប់) គឺងាយនឹងឆ្លងមេរោគជាងរុក្ខជាតិចាស់។

• រោគសញ្ញាទូទៅនៃជំងឺវីរុស



ក្រិន

រូញ


លឿង

ម៉ូសាអ៊ីច

ស្នាមប្រពេកប្រតាក

តូចរៀវ

• ជំងឺវីរុសសំខាន់ៗភាគច្រើនត្រូវបានចម្លងដោយវិច័យទំរុសតូលីក



ពពួកចេជញ្ជក់កូរុស

ជំងឺវីរុសលឿងបង្កដោយចេជញ្ជក់កូរុសលើអំបូរត្រសក់ (CABYV)



ជំងឺវីរុសអុជរង្វង់ល្អុង (PRSV)




ជំងឺវីរុសលឿងម៉ូសាអ៊ីចននោងបារាំង (ZYMV)



ជំងឺវីរុសស្នាមទ្រនុងស្លឹកម្ទេស (ChiVMV)



ជំងឺវីរុសម៉ូសាអ៊ីចត្រសក់ (CMV)



រុយស

ជំងឺវីរុសរូញស្លឹកម្ទេស (PepLCV)



ជំងឺវីរុសរូញស្លឹកប៉ងប៉ោះ (TLCV)




ជំងឺវីរុសរូញស្លឹកល្អៅក្តាម (SLCV)



ជំងឺវីរុសរូញស្លឹកពោតបារាំង (OELCuV)



ជំងឺវីរុសម៉ូសាអ៊ីចលឿងទ្រនុងស្លឹកពោតបារាំង (OYVMV)



ទ្រីប

ជំងឺវីរុសស្លោកអុជប៉ងប៉ោះ (TSWV)



ជំងឺវីរុសស្នាមប្រាក់ឌីឡើក (WMSMoV)



ជំងឺវីរុសអុជលឿង (MYSV)

ពិនិត្យមើលរោគសញ្ញាច្រើន មិនអាចប្រើរោគសញ្ញាតែមួយមុខដើម្បីកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺវីរុសច្បាស់លាស់នោះទេ ខណៈដែលរោគសញ្ញាមួយអាចបណ្តាលមកពីវីរុសខុសៗគ្នាជាច្រើន។

សូមអ្នកឯកទេសក្នុងតំបន់ប្រសិនបើមានការសង្ស័យ។

• តើត្រូវគ្រប់គ្រងវីចទ័រសត្វល្អិត និងវីរុសដែលចម្លងមកតាមរបៀបណា ?

ការបង្ការ: តើត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតាមរបៀបណា ?




ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនៃការដាំដំណាំ ច្បាស់ណាស់ និងកត្តាសត្វល្អិតចង្រៃ។



ការដាំដំណាំបង្វិល



ប្រើប្រាស់ពូជដែល ធន់ទ្រាំនឹងជំងឺវីរុស



ប្រើប្រាស់បណ្តុះដែលមាន សំណាញ់បំបាត់ជំងឺ ការពារកូនជំណាក់



ការប្រើកៅស៊ូគ្របដំណាំ



ត្រូវដាំរុក្ខជាតិផ្កា ដើម្បីទាក់ទាញ សត្វល្អិតមានអត្ថប្រយោជន៍



ត្រូវសម្អាតស្មៅ ឬសស ដើម្បីជៀសផុតពីជម្រកជំងឺ

ការត្រួតពិនិត្យ: តើត្រូវពិនិត្យវត្តមានវីចទ័រសត្វល្អិតតាមរបៀបណា ?



ត្រូវពិនិត្យជាប្រចាំ ថ្ងៃនៅក្នុងច្បារដំណាំ



ត្រូវការមើលនៅផ្នែកខាងក្រោមស្លឹក



ត្រូវពិនិត្យស្លឹកដែលខូច ឬរុញ ផ្សិតម្រងក្លើង និងស្លាកស្នាមពណ៌ប្រាក់



ត្រូវប្រើអន្ទាក់ស្លឹកពណ៌លឿង (ពពួករុយស និងពពួកចៃជញ្ជក់រុក្ខស) និងពណ៌ខៀវ (ពពួកទ្រីប)



ការអន្តរាគមន៍: តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលមានវត្តមានវីចទ័រសត្វល្អិត ?



ត្រូវដករុក្ខជាតិដែលមានជំងឺចេញ និងបំបាត់ចោល (ដុតចោល)

ធាតុសកម្ម	ក្រុមបែបផែនធាតុសកម្ម	ពពួកចៃជញ្ជក់រុក្ខស	ពពួករុយស	ពពួកទ្រីប
ថ្នាំចាក់ព្យាបាល	មិនស្គាល់	✓	✓	✓
អាសេតាមីព្រីដ (Acetamiprid)	4A	✓	✓	✓
ស្ទីនូសាដី (Spinosad)	5	✓	✓	✓
អ៊ីម៉ាមេទីន បង់សូអាត (Emamectin benzoate)	9B	✓	✓	✓

* មិនត្រូវបាញ់ថ្នាំក្នុងអំឡុងពេលចេញផ្កា

- ត្រូវប្រើឆ្នាស់ក្រុមបែបផែនធាតុសកម្ម ដើម្បីបង្ការការកើនឡើងនូវភាពស៊ាំថ្នាំកសិកម្ម
- ត្រូវធានានូវការបាញ់ថ្នាំកសិកម្មបានសព្វល្អនៅផ្នែកក្រោមស្លឹក
- ត្រូវប្រើឧបករណ៍ការពារខ្លួន (PPE) នៅពេលកំពុងបាញ់ថ្នាំកសិកម្ម
- ត្រូវលាងសម្អាតបន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំរួច