



ការបណ្តុះកូនដំណាំ

ការណែនាំអំពីបច្ចេកទេស

- សំភារៈសំរាប់បណ្តុះកូនដំណាំ



CAMBODIA



កន្លែងស្លឹកចេក ឬស្លឹកស្វាយ



ថាសបណ្តុះ ឬថង់បណ្តុះ



• ការរៀបចំល្បាយដីបណ្តុះ



បែងដី



ជីលាមកសត្វ ពុកផុយ១ភាគ
ជីដំបូក ១ ទៅ ២ ភាគ



បន្ទាប់ពីលាយល្បាយរួច ត្រូវផ្សើមទឹកអោយល្បាយ ដ៏មានសំណើមគ្រប់គ្រាន់

ការសំលាប់មេរោគដោយ (លីង ឬចំហុយ)



- » សំលាប់មេរោគរយៈពេល ១០-៣០នាទី
- » កុំទុកអោយស្ងួត
- » ចំហុយល្បាយដីដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភ្នាក់ងារចំលងមេរោគ
- » ជៀសវាងធ្វើការកំដៅនៅពេលដែលដីស្ងួត ដោយហេតុថាការផ្លាស់ប្តូរគីមីសាស្ត្រក្នុងល្បាយដីអាចកើតឡើង



ច្របាច់ដីមើលសំណើម កុំអោយសើមពេក

ការសំលាប់មេរោគ ដោយ (ដាក់ហាលថ្ងៃ)


ឬ



ដាក់ល្បាយដីបណ្តុះចូលក្នុងថង់រួចចងមាត់ជិត ដាក់ហាលថ្ងៃយ៉ាងតិចអោយបាន៤ម៉ោង

• សំភារៈសំរាប់បណ្តុះកូនដំណាំ

យកល្បាយដីបណ្តុះដាក់ចូលទៅក្នុងថាស
ឬកន្លែងបណ្តុះ និងដាក់សាបគ្រាប់




ដាក់គ្រាប់ជម្រៅ ២ដងទទឹងគ្រាប់



ដាក់១គ្រាប់ក្នុង១រណ្តៅ

ប្រសិនបើប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពល្អ ការសាបគ្រាប់អាចសាបគ្រាប់ផ្ទាល់ក៏បាន
ហាមគ្រាំគ្រាប់ នៅរដូវត្រជាក់អាចផ្តាច់អាយុដុះពន្លកមុនរួចចាំយកទៅបណ្តុះក្នុងថាស



ប្រើសំណាញ់ពណ៌ស ដើម្បីការពារកូនដំណាំពីការបំផ្លាញរបស់ពពួកសត្វល្អិតជញ្ជក់ដែលចម្លងជម្ងឺវីរុស



លាយដីកាល់ស្យូប្រទិន្រ្ទាត ១០ ទៅ ១៥ក្រាម ជាមួយទឹក ១០ លីត្រ
ចាញ់ទៅលើកូនដំណាំបន្ទាប់ពីដុះបាន ១០ថ្ងៃ (ប្រសិនបើចាំបាច់)

លាងសំអាតស្លឹកជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីចាញ់ដីរួច

• ការបន្ស៊ាំ និងការដាំកូនដំណាំ



កាត់បន្ថយការស្រោចទឹក និងដាក់កូនដំណាំឱ្យនឹងពន្លឺថ្ងៃ ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃមុនយកកូនទៅដាំ



ងាយស្រួលដឹកជញ្ជូនទៅក្នុងច្បារដំណាំ



ត្រូវស្រោចទឹកលើកូនដំណាំតិចតួចនៅពេលព្រឹក មិនត្រូវអោយសើមពេក ឬស្ងួតពេក នៅពេលយកកូនដំណាំទៅដាំនៅពេលរសៀល



ជៀសវាងការដាំកូនជ្រៅពេក ឬរាក់ពេក និងត្រូវស្រោចទឹកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដាំរួច



កូនដំណាំមានសុខភាពល្អដោយមានប្រព័ន្ធឫសលូតលាស់បានល្អ

សារៈប្រយោជន៍នៃការផលិតកូនដំណាំបានល្អ

- » កូនដំណាំមានគុណភាពខ្ពស់ និងដុះមកស្មើៗគ្នា បង្កើតការលូតលាស់ល្អនៅក្នុងច្បារដំណាំ
- » ងាយស្រួលកាន់
- » គ្មានជម្ងឺនៅក្នុងដី
- » ថាសបណ្តុះកូនដំណាំអាចប្រើបានឡើងវិញទៀត បន្ទាប់ពីមានការលាងសំអាត និងរក្សាទុកបានត្រឹមត្រូវ
- » ការពារកូនដំណាំក្នុងថ្នាលបណ្តុះកូន និងបង្ការពីការបំផ្លាញដោយផ្ទាល់ពីកំដៅពន្លឺព្រះអាទិត្យ ភ្លៀង សត្វល្អិត និងការចលងពីវីរុស

<http://guides.eastwestseed.com>

មគ្គុទ្ទេសក៍បច្ចេកទេសនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផលិតដោយ EWSF ©2017 រក្សាសិទ្ធិថតចម្លងដោយ East-West Seed Foundation គ្រប់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុក។
Agrochemical recommendations have been developed in cooperation with Wageningen University & Research

