



KNOWLEDGE
TRANSFER


သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုလမ်းညွှန် မုန်ညှင်း

• မြေပြုပြင်ခြင်း-စိုက်ဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း

- » စိုက်ဘောင်ကြားရှိမြောင်းငယ်သည် ရေသွင်းရေထုတ် လွယ်ကူစေရန် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသည်။
- » ပေါင်းမြက်များရှင်းသန့်ကြီးထွားမှုလျော့ချရန်နှင့် အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် ပလပ်စတစ် (သို့) သဘာဝ ဖြစ်သော ကောက်ရိုး အစရှိသည့် ပစ္စည်းများကို လည်းဖုံးအုပ်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
- » တစ်ဧကအပင်ဦးရေ - ၈၉၉၀၀ (အသုံးပြုသောမျိုးနှင့် ရာသီဥတုပေါ်မူတည်၍ အပင်အရေအတွက်ကို ချိန်ညှိလုပ်ဆောင်ပါ)




MYANMAR




စိုက်ပျိုးခြင်း

- » တုတ် (သို့) ဒေသသုံးကိရိယာကို အသုံးပြုပြီး ပင်ကြားတန်းကြား စိုက်ကွက်ဖော်ပါ။
- » မျိုးစေ့ကို ခပ်ပါးပါးစိုက်ပါ။
- » အပင်ကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း မှုန်း(နုတ်)ပါ။
 - အပင်ငယ် ၄ လက်မ
 - အပင်လတ် ၈ လက်မ
 - အပင်ကြီး (၁၀ - ၁၂) လက်မ
- » မှုန်း(နုတ်)လိုက်သောအပင်များကို စားသုံးခြင်း(သို့) ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။



မြေဩဇာ အသုံးပြုခြင်း



မြေဩဇာပမာဏသည် သီးနှံပင်၏သင့်တော်သောအဟာရလိုအပ်မှုနှင့် တစ်ဧက အပင်ဦးရေ ၈၉၉၀၀ ပင် ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။
မြေဩဇာကျွေးရာတွင် သီးနှံပင်ကြီးထွား မှုအဆင့်၊ မြေဆီလွှာအခြေအနေနှင့် ရာသီဥတုပေါ်မူတည်၍ ချိန်ညှိဆောင်ရွက်ပါ။

ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှု



- » အင်းဆက်ပိုးမွှားများကျရောက်မှုကို စစ်ဆေးထောက်လှမ်းရန်နှင့် အစုလိုက်အပုံလိုက်ဖမ်းရန်စေးကပ် ထောင်ချောက်များအသုံးပြုပါ။
- » စိန်ကွက်ဖလံကိုနှိမ်နင်းရန် အချိုရည်ထောင်ချောက်(သို့) မီးထောင်ချောက်ကို အသုံးပြုပါ။



ရောဂါပျံ့ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန် ကွင်းထဲရှိရောဂါရှိသောအပင်များ၊ သီးနှံပင်ဟောင်းများနှင့် ပေါင်းမြက်များ ကိုဖယ်ရှား၍ဖျက်ဆီးပါ။



သီးလှည့်စိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့် ရောဂါပိုးမွှားများစုပုံကျရောက်ခြင်းကို တားဆီးရုံမက မြေဆီလွှာကိုလည်း ထက်သန်စေသည်။

● ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုခြင်း

- » ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန် ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စုများကိုအလှည့်ကျသုံးစွဲပါ။ ပျက်ဆီးနေသောအပင်များကို ဖယ်ရှားပါ။
- » အရွက်စားသီးနှံများအတွက်ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းခြင်းကို ရှောင်ရှားရမည်။ လိုအပ်ပါက မရိတ်သိမ်းမီ(၇) ရက်အလိုတွင်ဆေးဖျန်း ခြင်းကို လျော့ချပါ။
- » ပိုးသတ်ဆေးအညွှန်းများကိုသေချာစွာ ဖတ်ရှု၍အညွှန်းပါအတိုင်း အသုံးပြုပါ။ (သတ်မှတ်ထားသောသီးနှံ နှင့် ပိုးမွှားရောဂါ)



ဆေးအစစ်	ဆေးအာနိသင်	ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ	ပျ	လောက်ကောင်	စိန်ကွက်ဖလံ	လှေးကျိုင်း
လမ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓
ဒိုင်နိုတီဖြူရမ် (Dinotefuran)	4A	S	✓			✓
စပိုင်နိုဆက် (Spinosad)	5	S		✓	✓	✓
စပိုင်နိုတိုရမ် (Spinetoram)	5	SC		✓	✓	
အဘာမက်တင် (Abamectin)	6	Slight S(အနည်းငယ်သော ပင်လုံးပြန့် အာနိသင်)		✓	✓	✓
သိုင်အိုဆိုင်ကလမ်အောက်ဆဲလ်လိတ် (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓			
ကလိုရိုထရပ်နေလီပရိုပီလ်(Chlorantraniliprole)	28	S		✓	✓	
ဖလူဘင်ဒိုင်ယာမိုက် (Flubendiamide)	28	S		✓	✓	
ဘက်စီးလပ် သရိုဂျီအန်းစစ် (Bacillus thuringiensis)	11A	C		✓	✓	
အာဒီရာဆိုင်တင်(တမာစစ်ထုတ်ရည်) (Azadirachtin (neem extract))	UN	မသိနိုင်သော	✓	✓	✓	✓

IRAC ကိုအခြေခံထားသော ဆေးအုပ်စု(ဆေးပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ)၊ SC(စားသေ+ ထိသေ)၊ S(ပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေး)



ဆေးအစစ်	ဆေးအာနိသင်	ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ	မှတ်ချက်	အော်တာနေရီးယားရွက်ပြောက်ရောဂါ	ဒေါင်းနီးမိုရောဂါ
ကော့ပါးအခြေခံ မိုသတ်ဆေးများ (Copper-based Fungicides)	M 01	P		✓	✓
ကလိုရိုသာရိုနေးလ် (Chlorothalonil)	M 05	P		✓	✓
မန်ကိုဇပ် (Mancozeb)	M 03	P		✓	✓
အဆိုဒီစထရိုဘင် (Azoxystrobin)	11	P + C	သီးနှံသက်တမ်းတလျှောက် အများဆုံး ၄ ကြိမ်သာ	✓	✓
ပရိုပါမိုကပ် (Propamocarb)	28	P + C			✓
ဆိုင်မိုဇာနေးလ် (Cymoxanil)	27	C	ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပေးရမည်။ (ကလိုရိုသာရိုနေးလ် (သို့) မန်ကိုဇပ်)		✓
မက်တယ်လာဇီး (Metalaxyl)	4	P + C	ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအန္တရာယ်လျော့နည်းစေရန် သီးနှံသက်တမ်းတလျှောက် အများဆုံး ၂ ကြိမ်သာ အသုံးပြုသင့်သည်။		✓
ဘက်စီးလပ် ဆပ်တီးလစ် (Bacillus subtilis)	BM02	P			✓

FRAC ကိုအခြေခံထားသော ဆေးအုပ်စု(ဆေးပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ)၊ P = ကာကွယ်ဆေး(သီးနှံပင်ပေါ်၌ ရောဂါ လက္ခဏာမဖြစ်ပေါ် မီသာလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်)၊ C = ကုသဆေး

အကာအကွယ်ပစ္စည်းများဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါ။

ရာသီဥတုကောင်းမွန်သောအချိန်တွင် ဆေးဖျန်းပါ။

ကောင်းမွန်သောဆေးဖျန်းခေါင်းကို အသုံးပြုပါ။

ဆေးဖျန်းပြီးပါက ကောင်းမွန်စွာဆေးကြောပါ။



KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

East West Seed Foundation ၏ ၂၀၂၁ မှပိုင်ခွင့်။

စိုက်ပျိုးရေးသုံးစာတိုင်းသတ်ဆေး အကြံပြုချက်များကို Wageningen University & Research နှင့်ပူးပေါင်း၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။