



KNOWLEDGE
TRANSFER

သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုလမ်းညွှန် ဗိုလ်စားပဲ

• မြေပြုပြင်ခြင်း-စိုက်ဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း

- » စိုက်ဘောင်ကြားရှိမြောင်းငယ်သည် ရေသွင်းရေထုတ်လွယ်ကူစေရန် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသည်။
- » ပေါင်းမြက်များရှင်သန်ကြီးထွားမှုလျော့ချရန်နှင့် အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် ပလပ်စတစ် (သို့) သဘာဝ ဖြစ်သော ကောက်ရိုး အစရှိသည့် ပစ္စည်းများကို လည်းဖုံးအုပ်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
- » ရွှေမစိုက်မီ နွယ်တက်ရန် စင်ဆောက်လုပ်ထားသင့်သည်။
- » တစ်ဧကအပင်ဦးရေ - ၁၀၇၀၀ (အသုံးပြုသောမျိုးနှင့် ရာသီဥတုပေါ်မူတည်၍ အပင်အရေအတွက်ကို ချိန်ညှိလုပ်ဆောင်ပါ)



MYANMAR



ရွှေမစိုက်မီ (၆×၃) ပတ်လည်ဘောင်တိုင်းတွင် (၁၅)ပတ်လည် မြေဩဇာ ဟင်းစားဇွန်း(၈)ဇွန်းနှင့် နွားချေး သို့မဟုတ် မြေဆွေး (၂)ပြည်အား မြေကြီးထဲသို့ ထည့်ပြီး ရောမွှေကာ စိုက်ဘောင်ပြင်ဆင်ရမည်။

၁ ပေခွဲ

၁ ပေခွဲ

၃ ပေ အကျယ် ၁ ပေ အမြင့် (၉ လက်မ= ခြောက်သွေ့ရာသီ)


• စိုက်ပျိုးခြင်း



» တစ်ကျင်းလျှင် မျိုးစေ့နှစ်
စေ့စိုက်ပြီး အပင် ၄ လက်မအရွယ်
သို့ ရောက်သောအခါ တစ်ပင်ကို
မှုန့်(နုတ်)လိုက်ပါ။



• မြေဩဇာ အသုံးပြုခြင်း



မြေဩဇာပမာဏသည် သီးနှံပင်၏သင့်တော်သောအာဟာရလိုအပ်မှုနှင့် တစ်ဧက အပင်ဦးရေ ၁၀၇၀၀ ပင် ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။
မြေဩဇာကျွေးရာတွင် သီးနှံပင်ကြီးထွား မှုအဆင့်၊ မြေဆီလွှာအခြေအနေနှင့် ရာသီဥတုပေါ်မူတည်၍ ချိန်ညှိဆောင်ရွက်ပါ။

• ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှု



» အင်းဆက်ပိုးမွှားများကျရောက်မှုကို စစ်ဆေးထောက်လှမ်းရန်နှင့် အစုလိုက်အပုံလိုက်ဖမ်းရန်
စေးကပ် ထောင်ချောက်များအသုံးပြုပါ။



ရောဂါပျံ့ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန် ကွင်းထဲရှိရောဂါရှိ
သောအပင်များ၊ သီးနှံပင်ဟောင်းများနှင့် ပေါင်းမြက်
များ ကိုဖယ်ရှား၍ဖျက်ဆီးပါ။



သီးလှည့်စိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့် ရောဂါပိုးမွှားများစုပုံကျ
ရောက်ခြင်းကို တားဆီးရုံမက မြေဆီဩဇာကိုလည်း
ထက်သန်စေသည်။

● ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုခြင်း

- » ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန် ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စုများကိုအလှည့်ကျသုံးစွဲပါ။
- » ပိုးသတ်ဆေးအညွှန်းများကိုသေချာစွာ ဖတ်ရှု၍အညွှန်းပါအတိုင်း အသုံးပြုပါ။(သတ်မှတ်ထားသောသီးနှံ နှင့် ပိုးမွှားရောဂါ)



ဆေးအစစ်	ဆေးအာနိသင်	ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ	လှေး	ပျ	ယင်ဖြူ	ရွက်ထွင်းပိုး	သီးတောင့်ထိုးပိုး
လမ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ဒိုင်နိုတီဖြူရင် (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓	✓	✓
စပိုင်နိုဆက် (Spinosad)	5	S				✓	✓
စပိုင်နိုတိုရမ် (Spinetoram)	5	SC				✓	✓
အဘာမက်တင် (Abamectin)	6	Slight S(အနည်းငယ်သော ပင်လုံးပြန့် အာနိသင်)	✓			✓	✓
သိုင်အိုဆိုင်ကလမ်အောက်ဆဲလ်လိတ် (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ကလိုရိုထရမ်နေလီပရိုလ် (Chlorantraniliprole)	28	S					✓
ဖလူဘမ်ဒိုင်ယာမိုက် (Flubendiamide)	28	S					✓
ဘက်စီးလပ် သရိုဂျီအန်းစစ် (Bacillus thuringiensis)	11A	C					✓
အဇာဒိုရာဆိုင်တင်(တမာစစ်ထုတ်ရည်) (Azadirachtin (neem extract))	UN	မသိနိုင်သော	✓	✓	✓	✓	✓

IRAC ကိုအခြေခံထားသော ဆေးအုပ်စု(ဆေးပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ)၊ SC(စားသေ+ ထိသေ)၊ S(ပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေး)



ဆေးအစစ်	ဆေးအာနိသင်	ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ	မှတ်ချက်	ရွက်ပြောက်ရောဂါ	ဖားဥပွိုရောဂါ	သံချေးရောဂါ	အဝါရောင်မိုစိတ်ပိုင်းရပ်ရောဂါ
ကော့ပါးအခြေခံ မိုသတ်ဆေးများ (Copper-based Fungicides)	M 01	P		✓	✓	✓	ရောဂါကင်းသောပျိုးပင်များ(သို့) ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများကို အသုံးပြုပါ။
ကလိုရိုထရိုနေးလ် (Chlorothalonil)	M 05	P		✓	✓	✓	
မန်ကိုဇပ် (Mancozeb)	M 03	P		✓	✓	✓	
အဆိုဇီစတရိုဘင် (Azoxystrobin)	11	P + C	သီးနှံသက်တမ်းတလျှောက် အများဆုံး ၄ ကြိမ်သာ	✓	✓	✓	ယင်ဖြူကို ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲပါ။
ဘက်စီးလပ် ဆပ်တီးလစ် (Bacillus subtilis)	BM02	P		✓	✓		

FRAC ကိုအခြေခံထားသော ဆေးအုပ်စု(ဆေးပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ)၊ P = ကာကွယ်ဆေး(သီးနှံပင်ပေါ်၌ ရောဂါ လက္ခဏာမဖြစ်ပေါ် မီသာလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်)၊ C = ကုသဆေး

- အကာအကွယ်ပစ္စည်းများဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါ။
- ရာသီဥတုကောင်းမွန်သောအချိန်တွင် ဆေးဖျန်းပါ။
- ကောင်းမွန်သောဆေးဖျန်းခေါင်းကို အသုံးပြုပါ။
- ဆေးဖျန်းပြီးပါက ကောင်းမွန်စွာဆေးကြောပါ။



KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

East West Seed Foundation ၏ ၂၀၂၁ မှပိုင်ခွင့်။

စိုက်ပျိုးရေးသုံးစာတုပ္ပိးသတ်ဆေး အကြံပြုချက်များကို Wageningen University & Research နှင့်ပူးပေါင်း၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။