



KNOWLEDGE
TRANSFER


သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုလမ်းညွှန် တရုတ်မုန်ညှင်းဖြူထုပ်

● မြေပြုပြင်ခြင်း-စိုက်ဘောင်ပြုလုပ်ခြင်း

- » စိုက်ဘောင်ကြားရှိမြောင်းငယ်သည် ရေသွင်းရေထုတ် လွယ်ကူစေရန် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသည်။
- » ပေါင်းမြက်များရှင်သန်ကြီးထွားမှုလျော့ချရန်နှင့် အစိုဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန် ပလပ်စတစ် (သို့) သဘာဝ ဖြစ်သော ကောက်ရိုး အစရှိသည့် ပစ္စည်းများကို လည်းဖုံးအုပ်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
- » တစ်ဧကအပင်ဦးရေ ၁၀၇၀၀ - ၁၈၀၀၀ (အသုံးပြုသောမျိုးနှင့် ရာသီဥတု ပေါ်မူတည်၍ အပင် အရေအတွက်ကို ချိန်ညှိလုပ်ဆောင်ပါ)



MYANMAR



ရွှေမစိုက်မီ (၆×၃) ပတ်လည်ဘောင်တိုင်းတွင် (၁၅)ပတ်လည် မြေဩဇာ ဟင်းစားဇွန်း(၆)ဇွန်းနှင့် နွားချေး သို့မဟုတ် မြေဆွေး (၂)ပြည်အား မြေကြီးထဲ သို့ ထည့်ပြီး ရောမွှေကာ စိုက်ဘောင်ပြင်ဆင်ရမည်။

၁ ပေခွဲ

၁ ပေခွဲ

၃ ပေ အကျယ် ၁ ပေ အမြင့် (၉ လက်မ = ခြောက်သွေ့ရာသီ)

● ပျိုးပင်လေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

◆ ပျိုးမြေပြင်ဆင်ခြင်း-ပျိုးမြေများကို (၁၀)မိနစ်ခန့် အပူပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) ပလပ်စတစ်အိတ် အနက်ထဲသို့ထည့်ကာ နေရောင်အောက်တွင် နေ့ဝက်ခန့် ထားပေးရမည်။ ခေတ္တအအေးခံ၍ ပျိုးဘုန်းထဲသို့ထည့်ပါ။



မြေကြီးတစ်ဆ- နှစ်ဆ




ဆွေးမြေပြီးသော နွားချေး သို့မဟုတ် မြေဆွေး တစ်ဆ




သဲ သို့မဟုတ် စပါးခွံဖွဲပြာ တစ်ဆ



◆ မျိုးစေ့ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပျိုးပင်များအား ဘေးအန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ခြင်း



မျိုးစေ့ စိုက်မည့်အနက်=မျိုးစေ့ နှစ်စေ့၏ အရွယ်အစား



လေဝင်လေထွက်ကောင်းရမည်။

◆ အစိုဓာတ် လုံလောက်စွာ ထားရမည်။



မနက်ခင်း





ညနေခင်း

လိုအပ်ပါက အညောက်ပေါက်ပြီး ၁၀ ရက်နောက်ပိုင်း ရေ ၁၀ လီတာနှင့် ကယ်လ်စီယမ်နိုက်ထရိတ် ၁ ဇွန်း (သို့) ၁ ဇွန်းခွဲကို သမအောင်ရောမွှေပြီး ပျိုးပင်များကို ဖျန်းပေးပါ။




၁၄ - ၂၁ ရက်

◆ ရွှေ့မစိုက်မီ ၅-၇ ရက်အလိုတွင် ပျိုးပင်လေးများ အကြမ်းခံလာစေရန် ရေဖြတ်ပေးခြင်း၊ နေရောင်နှင့် ပိုမိုထိတွေ့ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပျိုးပင်များကို ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပါ။



● မြေဩဇာ အသုံးပြုခြင်း



● ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှု



» အင်းဆက်ပိုးမွှားများကျရောက်မှုကို စစ်ဆေးထောက်လှမ်းရန်နှင့် အစုလိုက်အပုံလိုက်ဖမ်းရန်စေးကပ် ထောင်ချောက်များအသုံးပြုပါ။
» စိန်ကွက်ဖလံကိုနှိမ်နင်းရန် အချိုရည်ထောင်ချောက်(သို့) မီးထောင်ချောက်ကို အသုံးပြုပါ။



ရောဂါပျံ့ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန် ကွင်းထဲရှိရောဂါရှိသောအပင်များ၊ သီးနှံပင်ဟောင်းများနှင့် ပေါင်းမြက်များ ကိုဖယ်ရှား၍ဖျက်ဆီးပါ။



သီးလှည့်စိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့် ရောဂါပိုးမွှားများစုပုံကျရောက်ခြင်းကို တားဆီးရုံမက မြေဩဇာကိုလည်း ထက်သန်စေသည်။

● ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုခြင်း

- » ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန် ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စုများကိုအလှည့်ကျသုံးစွဲပါ။
- » ပိုးသတ်ဆေးအညွှန်းများကိုသေချာစွာ ဖတ်ရှု၍အညွှန်းပါအတိုင်း အသုံးပြုပါ။(သတ်မှတ်ထားသောသီးနှံ နှင့် ပိုးမွှားရောဂါ)




ယင်ဖြူ			ပျ	လောက်ကောင်		စိန်ကွက်ဖလံ	လှေးကျိုင်း
ဆေးအစစ်	ဆေးအာနိသင်	ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ	ယင်ဖြူ	ပျ	လောက်ကောင်	စိန်ကွက်ဖလံ	လှေးကျိုင်း
လမ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ဒိုင်နိုတီဖြူရမ် (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓			✓
စပိုင်နိုဆက် (Spinosad)	5	S			✓	✓	✓
စပိုင်နိုတိုရမ် (Spinetoram)	5	SC			✓	✓	
အဘာမက်တင် (Abamectin)	6	Slight S(အနည်းငယ်သောပင်လုံးပြန့်အာနိသင်)			✓	✓	✓
သိုင်အိုဆိုင်ကလမ်အောက်ဆဲလ်လိတ် (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓			
ကလိုရိုထရမ်နေးလီပရိုလ်(Chlorantraniliprole)	28	S			✓	✓	
ဖလူဘင်ဒိုင်ယာမိုက် (Flubendiamide)	28	S			✓	✓	
ဘက်စီးလပ် သရိုဂျီအန်းစစ် (Bacillus thuringiensis)	11A	C			✓	✓	
အဇာဒီရာဆိုင်တင်(တမာစစ်ထုတ်ရည်) (Azadirachtin (neem extract))	UN	မသိနိုင်သော	✓	✓	✓	✓	✓

IRAC ကိုအခြေခံထားသော ဆေးအုပ်စု(ဆေးပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ)၊ SC(စားသေ + ထိသေ)၊ S(ပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေး)



အနက်ပုပ်ရောဂါ			ဘက်တီးရီးယားပျော့ပုပ်ရောဂါ	အော်တာနေးရီးယားရွက်ပြောက်ရောဂါ		ဒေါင်းနီးမိုရောဂါ	
ဆေးအစစ်	ဆေးအာနိသင် ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ		မှတ်ချက်	အနက်ပုပ်ရောဂါ	ဘက်တီးရီးယားပျော့ပုပ်ရောဂါ	အော်တာနေးရီးယားရွက်ပြောက်ရောဂါ	ဒေါင်းနီးမိုရောဂါ
ကော့ပါးအခြေခံ မှိုသတ်ဆေးများ (Copper-based Fungicides)	M 01	P	ဘက်တီးရီးယားရောဂါများအတွက် - လိုအပ်မှသာလျှင်အသုံးပြုပါ။ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှား နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထားအတိုင်း အသုံးပြုပါ။ ပိုမိုသုံးပါကပိုမို	✓	✓	✓	✓
ကလိုရိုထရိုနေးလ် (Chlorothalonil)	M 05	P	သီးနှံသက်တမ်းတလျှောက် အများဆုံး ၄ ကြိမ်သာ	ကုသဆေးဖျန်းပေးရန်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပေ။		✓	✓
မန်ကိုဇပ် (Mancozeb)	M 03	P		စိုက်ခင်းကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ သီးလှည့်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် စိုက်ဘောင်များပြုလုပ်၍စိုက်ပျိုးခြင်းအစရှိသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။		✓	✓
အဆိုဇီစတရိုဘင် (Azoxystrobin)	11	P + C		ရေကို ပြည့်လျှံအောင်သွင်းပေးခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။		✓	✓
ပရိုပါမိုကပ် (Propamocarb)	28	P + C					✓
ဆိုင်မိုဇာနေးလ် (Cymoxanil)	27	C					✓
မက်တယ်လာနီး (Metalaxyl)	4	P + C	ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအန္တရာယ်လျော့နည်းစေရန် သီးနှံသက်တမ်းတလျှောက် အများဆုံး ၂ ကြိမ်သာ အသုံးပြုသင့်သည်။				✓
ဘက်စီးလပ် ဆပ်တီးလစ် (Bacillus subtilis)	BM02	P		✓	✓		✓

FRAC ကိုအခြေခံထားသော ဆေးအုပ်စု(ဆေးပြုမူဆောင်ရွက်ပုံ)၊ P = ကာကွယ်ဆေး(သီးနှံပင်ပေါ်၌ ရောဂါ လက္ခဏာမဖြစ်ပေါ် မီသာလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်)၊ C = ကုသဆေး



- 1 အကာအကွယ်ပစ္စည်းများဝတ်ဆင်သုံးစွဲပါ။
- 2 ရာသီဥတုကောင်းမွန်သောအချိန်တွင် ဆေးဖျန်းပါ။
- 3 ကောင်းမွန်သောဆေးဖျန်းခေါင်းကို အသုံးပြုပါ။
- 4 ဆေးဖျန်းပြီးပါက ကောင်းမွန်စွာဆေးကြောပါ။