




URDU

رہنمائی کتابچہ ویکس گورڈ

• زمین کی تیاری

- تنگ کھالا اچھی آبپاشی اور نکاسی کے لئے مفید ہے
- مٹی کی نمی کو محفوظ رکھنے اور جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کو کم کرنے کے لیے نامیاتی یا پلاسٹک کی ملچ لگائی جا سکتی ہے۔
- اگر سٹیکنگ کرنی ہو تو منتقلی سے پہلے کریں۔
- 1,500 سے 2,500 پودے فی ایکڑ (وراثتی اور موسم کی مناسبت سے ایڈجسٹ کریں)



• پنیری کی تیار


◆ ٹرے کے لیے مٹی کی تیاری: درج ذیل مکسچر کو 10 منٹ تک اچھی طرح گرم کریں یا آدھا دن بھر پور سورج کی روشنی میں رکھیں اور ٹھنڈا کر کے ٹرے میں بھر لیں



ایک سے دو حصے بھل




ایک حصہ گلا ہوا گوبر




ایک حصہ جلا ہوا چاول کا چھلکا یا ریت

◆ بیج لگائیں اور پنیری کو محفوظ رکھیں




ہوا کی گزر کا خاص خیال رکھیں




بیج کی گہرائی، بیج کے سائز سے دوگنا رکھیں


◆ وتر ہر وقت برقرار رکھیں



8 تا 10 دن





شام



صبح

◆ پنیری کو منتقلی سے 2-3 دن پہلے پانی کم کر دیں اور سورج کی روشنی میں رکھیں اور پنیری کو شام میں منتقل کریں






برجگہ پر 2 بیج لگائیں اور 10 سینٹی میٹر پر پہنچ
کر ایک پودا رہنے دیں



• کھادوں کا استعمال



درجہ بالا دی گئی خوراک کی مقدار فصل کی متوازن خوراک کی ضرورت اور 1,500 سے 2,500 فی ایکڑ پودوں کے مطابق ہے۔ موسم، زمین کی صورتحال اور پودے کی نشوونما کے مطابق خوراک کی مقدار ایڈجسٹ کر لیں۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام



- کیڑے مکوڑوں کی نگرانی اور بڑے پیمانے پر پکڑنے کے لیے چپکنے والی شیٹ کا استعمال کریں۔
- فروٹ فلائی کے لیے سویٹ ٹریپ، تلسی کا عرق یا فیرومون ٹریپ استعمال کریں۔



ایک ہی زمین میں مختلف فصلوں کی گردش کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بحال کرتی ہے۔



بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیمار پودوں، پرانی فصلوں اور جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر تلف کر دینا چاہیے۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام اور کیڑے مار ادویات کا محفوظ استعمال

- کیڑوں میں مدافعت سے بچاؤ کے لئے متبادل طریقہ
- ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیبل اور مطلوبہ استعمال (رجسٹرڈ فصل اور کیڑے) کو پڑھیں



کیڑوں کی اقسام

ایکٹو اجزاء	زیر پزیری کا طریقہ	عمل	سست تیلہ	سفید مکھی	کیٹرپلر	لیف مائنر	بیٹل	فروٹ فلائی
لیمڈا - سائلوٹرین (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ڈینوٹیفورون (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سپائٹوساڈ (Spinosad)	5	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سپائینٹورم (spinetoram)	5	SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ایبامیکٹن (Abamectin)	6	SC (slight S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تھیوسائیکلیم آکسالیٹ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
کلورنٹرانلیپروول (Chlorantraniliprole)	28	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فلوبنڈی امانڈ (Flubendiamide)	28	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
بٹسلس تھرچنسنس (Bacillus thuringiensis)	11A	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(نیم کا عرق) Azadirachtin	UN	unknown	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IRAC کی بنیاد پر زیر پزیری کا طریقہ: S (سرائیت پزیری); SC (نظام ہضم + لمسی اثر)



بیماریوں کی اقسام

ایکٹو اجزاء	زیر پزیری کا طریقہ	عمل	ریمارکس	گمی سٹیم بلاٹ	ڈاؤنی مائلڈیو	پاؤڈری مائلڈیو	وائرس
(Copper) پر مبنی پھپھوندی کش ادویات	M 01	P		✓	✓	✓	
(Chlorothalonil) کلوروتھالونیل	M 05	P		✓	✓	✓	
(Mancozeb) مینکوزیپ	M 03	P		✓	✓	✓	
(Azoxystrobin) آزوکسیسٹروبین	11	P + C	ایک فصل کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 دفع	✓	✓	✓	
(Propamocarb) پروپاموکارب	28	P + C		✓	✓	✓	
(Cymoxanil) سائیموکسینل	27	C	ٹینک میں حفاظتی کیمیکل ڈالیں (کلوروتھالونیل اور مینکوزیپ)	✓	✓	✓	
(Metalaxyl) میٹالاکسل	4	P + C	مدافعت کا زیادہ خطرہ (اس لئے سیزن میں 2 دفع استعمال کریں)	✓	✓	✓	
(Bacillus subtilis) بیسیلس سبٹیلس	BM02	P		✓	✓	✓	

FRAC کی بنیاد پر زیر پزیری کا طریقہ: P = حفاظتی (صرف اس صورت میں مؤثر ہے جب بیماری کی علامات ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں); C = معالجاتی



4

سپرے کے بعد ہاتھ دھوئیں



3

اچھی نوزل کا استعمال کریں



2

اچھے موسم کا انتخاب کریں



1

حفاظتی پوشاک پہنیں

<https://growhow.eastwestseed.com>