




URDU

رہنمائی کتابچہ گیندے کا پھول

• زمین کی تیاری

- تنگ کھالا اچھی آبپاشی اور نکاسی کے لئے مفید ہے
- مٹی کی نمی کو محفوظ رکھنے اور جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کو کم کرنے کے لیے نامیاتی یا پلاسٹک کی ملچ لگائی جا سکتی ہے۔
- اگر سٹیکنگ کرنی ہے تو منتقلی کے 10 دن بعد کریں
- 12,000-7,500 پودے فی ایکڑ (وراثتی اور موسم کی مناسبت سے ایڈجسٹ کریں)





• پنیری کی تیار



◆ ٹرے کے لیے مٹی کی تیاری: درج ذیل مکسچر کو 10 منٹ تک اچھی طرح گرم کریں یا آدھا دن بھر پور سورج کی روشنی میں رکھیں اور ٹھنڈا کر کے ٹرے میں بھر لیں




◆ بیج لگائیں اور پنیری کو محفوظ رکھیں




◆ وتر ہر وقت برقرار رکھیں



◆ پنیری کو منتقلی سے 2-3 دن پہلے پانی کم کر دیں اور سورج کی روشنی میں رکھیں اور پنیری کو شام میں منتقل کریں



• کھادوں کا استعمال



- درجہ بالا دی گئی خوراک 12000 - 7500 فی ایکڑ پودوں کے مطابق ہے
موسم، زمین کی صورتحال اور پودے کی نشوونما کے مطابق خوراک کی مقدار ایڈجسٹ کر لیں۔


• کیڑوں کا مربوط انتظام



- کیڑے مکوڑوں کی نگرانی اور بڑے پیمانے پر پکڑنے کے لیے چپکنے والی شیٹ کا استعمال کریں۔



ایک ہی زمین میں مختلف فصلوں کی گردش کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بحال کرتی ہے۔



بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیمار پودوں، پرانی فصلوں اور جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر تلف کر دینا چاہیے۔

منتقلی کے 10 دن بعد یا پانچویں نوڈ پر اوپر والے پھول کو توڑ دیں

• کیڑوں کا مربوط انتظام اور کیڑے مار ادویات کا محفوظ استعمال

- کیڑوں میں مدافعت سے بچاؤ کے لئے متبادل طریقہ
- ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیبل اور مطلوبہ استعمال (رجسٹرڈ فصل اور کیڑے) کو پڑھیں



ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	سست تیلہ	سفید مکھی	کیٹر پلر	لیف مائنر	لال جوں
لیمڈا - سائلوٹرین (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ڈینوفیورون (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓	✓	
سپائنوساڈ (Spinosad)	5	S			✓	✓	
سپائینٹورم (spinetoram)	5	SC			✓	✓	
ایبامیکٹن (Abamectin)	6	SC (slight S)			✓	✓	✓
تھیوسائیکلیم آکسالیٹ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓		✓	
کلورنٹرانلیپرول (Chlorantraniliprole)	28	S			✓		
فلوبنڈی امانڈ (Flubendiamide)	28	S			✓		
بٹسلس تھرنجنسنس (Bacillus thuringiensis)	11A	C			✓		
(نیم کا عرق) Azadirachtin	UN	unknown	✓	✓	✓	✓	✓

IRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: S (سراثیت پزیری); SC (نظام بضم + لمسی اثر)



ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	ریہارکس	بیکٹیریل وٹ	متبادل لیف سپاٹ	پاؤڈری مائلڈیو	پھول کی پھپھوندی
(Copper) پر مبنی پھپھوندی کش ادویات	M 01	P	بیکٹیریل بیماریوں کے لیے: صرف اس وقت استعمال کریں جب ضروری ہو؛ ممکنہ مزاحمت سے بچنے کے لیے زیادہ استعمال نہ کریں	✓	✓	✓	✓
کلوروٹھالونیل (Chlorothalonil)	M 05	P			✓	✓	✓
مینکوزیب (Mancozeb)	M 03	P			✓	✓	✓
آزوکسیسٹروبین (Azoxystrobin)	11	P + C	ایک فصل کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 دفعہ		✓	✓	✓
(Bacillus subtilis) بیسیلیس سبٹیلس	BM02	P		✓		✓	✓

FRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: P = حفاظتی (صرف اس صورت میں مؤثر ہے جب بیماری کی علامات ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں)؛ C = معالجاتی



<https://growhow.eastwestseed.com>

کاپی رائٹ © 2021 از ایسٹ ویسٹ سیڈ فاؤنڈیشن۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ ایگرو کیمیکل سفارشات ویگننگن یونیورسٹی اینڈ ریسرچ کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں۔