



URDU

رہنمائی کتابچہ

پیاز


• زمین کی تیاری

- تنگ کھالا اچھی آبپاشی اور نکاسی کے لئے مفید ہے
- 240,000 پودے فی ایکڑ (وراثیتی اور موسم کی مناسبت سے ایڈجسٹ کریں)




♦ یرک رایت ہگج رٹیم عبرم 400 ژکیا یف یلےک یرایت یک یریپ



- ییئانب ڈیب
- یرک سکم رک لاڈ حرط یھچا یی نیمز ےلہپ
- ےس ییئایب ربوگ ینارپ مارگ ولک 3+15:15:15
- مارگ 160 رپ ےلصاف ےک ٹف 6 رہ
- یریپ ےرپس ےکرک سکم رہز رام ےژیکی چمچ اک
- ےئایچ کیا روا رہز شک یدنوھپھپ چمچ اک ےئایچ
- کیا یی یناپ رٹیل راچ
- یدیوب چیب ےک رک الٹپ الٹپ روا ییئانب یی راطق یرہگ
- رٹیم ییئانب ھژیڈ روا رپ ےلصاف رٹیم ییئانب 5-7.5
- ییھکر ےپناھڈ یی تقو نی رت مارگ دیدش ےک ند روا کت
- ےنلکن چروس حبص وک یریپ
- ییھکی وک ڈیب ڈیس رپ داینب یک نازور




-پیپناھڈ ےس کٹس الپ یی تروص یک شراب زیت



♦ وتر ہر وقت برقرار رکھیں



♦ صبح کے وقت پانی دیں، پودے کھودنے کے لیے ایک چھوٹی کدال کا استعمال کریں۔




الگ کریں اور 2.5 سینٹی میٹر گہرائی تک پودے لگائیں۔


• جڑی بوٹیوں کی تلفی



- جب 30 - 50 فیصد فصل خشک ہو جائے تو ہاتھ سے زمین سے پیاز نکال لیں
- مکمل خشک ہونے تک کھیت میں چھوڑ دیں۔



- بیڈز پر کھاد ڈالیں
- کھاد ڈالنے سے پہلے جڑی بوٹیوں کو ہٹا دیں۔



درجہ بالا دی گئی خوراک فصل کی متوازن خوراک کی ضرورت اور 240,000 فی ایکڑ پودوں کے مطابق ہے موسم، زمین کی صورتحال اور پودے کی نشوونما کے مطابق خوراک کی مقدار ایڈجسٹ کر لیں۔ -


• کیڑوں کا مربوط انتظام



- کیڑے مکوڑوں کی نگرانی اور بڑے پیمانے پر پکڑنے کے لیے چپکنے والی شیٹ کا استعمال کریں۔
- فروٹ فلائ کے لیے سویٹ ٹریپ، تلسی کا عرق یا فیرومون ٹریپ استعمال کریں۔



ایک ہی زمین میں مختلف فصلوں کی گردش کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بحال کرتی ہے۔



بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیمار پودوں، پرانی فصلوں اور جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر تلف کر دینا چاہیے۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام اور کیڑے مار ادویات کا محفوظ استعمال

- کیڑوں میں مدافعت سے بچاؤ کے لئے متبادل طریقہ
- ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیبل اور مطلوبہ استعمال (رجسٹرڈ فصل اور کیڑے) کو پڑھیں



ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	تھریس	کیٹرپلر	لیف مائر
لیمڈا - سائلوٹرن (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓
ڈینوفیورون (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓
سپائوساڈ (Spinosad)	5	S	✓	✓	✓
سپائینٹورم (spinetoram)	5	SC	✓	✓	✓
ایبامیکٹن (Abamectin)	6	SC (slight S)	✓	✓	✓
تھیوسائیکلیم آکسالیٹ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓
کلورنٹرانلیپرول (Chlorantraniliprole)	28	S	✓	✓	✓
فلوبندی امانڈ (Flubendiamide)	28	S	✓	✓	✓
بٹسلس تھرنجنسنس (Bacillus thuringiensis)	11A	C	✓	✓	✓
نیم کا عرق (Azadirachtin)	UN	unknown	✓	✓	✓

IRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: S (سراثیت پزیری) SC (نظام بضم + لمسی اثر)



ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	ریمارکس	اینٹھراکنوز	گلابی جڑیں	اسٹیمفیلیم لیف بلاٹ	جامنی رنگ کا دھبہ	بیکٹیریل سافٹ راٹ
(Copper) پر مبنی پھپھوندی کش ادویات	M 01	P	بیکٹیریل بیماریوں کے لیے: صرف اس وقت استعمال کریں جب ضروری ہو: ممکنہ مزاحمت سے بچنے کے لیے زیادہ استعمال نہ کریں	✓			✓	✓
کلوروٹھالونیل (Chlorothalonil)	M 05	P		✓			✓	✓
مینکوزیب (Mancozeb)	M 03	P		✓			✓	✓
آزوکسٹروبین (Azoxystrobin)	11	P + C	ایک فصل کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 دفع	✓			✓	✓
پروپاموکارب (Propamocarb)	28	P + C		✓			✓	✓
سائیموکسٹنل (Cymoxanil)	27	C	ڈینک میں حفاظتی کیمیکل ڈالیں (کلوروٹھالونیل اور مینکو زیب) مدافعت کا زیادہ خطرہ (اس لئے سیزن میں 2 دفع استعمال کریں)	✓			✓	✓
میٹالاکسل (Metalaxyl)	4	P + C		✓			✓	✓
بیسٹیلس سبٹیلس (Bacillus subtilis)	BM02	P		✓			✓	✓

FRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: P = حفاظتی (صرف اس صورت میں مؤثر ہے جب بیماری کی علامات ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں)؛ C = معالجاتی




سپرے کے بعد ہاتھ دھوئیں



اچھی نوزل کا استعمال کریں



اچھے موسم کا انتخاب کریں



حفاظتی پوشاک پہنیں

<https://growhow.eastwestseed.com>