




URDU

رہنمائی کتابچہ میٹھی مکئی

• زمین کی تیاری

- تنگ کھالا اچھی آبپاشی اور نکاسی کے لئے مفید ہے
- 20,500 پودے فی ایکڑ (ورائٹی اور موسم کی مناسبت سے ایڈجسٹ کریں)






- 1 تا 2 بیج فی سوراخ لگائیں اور جب پودا 4 انچ کا ہو تو صرف ایک پودا رکھ کر دوسرا نکال دیں
- اگر ایک بیج فی سوراخ لگایا ہے تو ٹرے میں زائد پنیری لگائیں تاکہ ناغے پورے ہو سکیں



• کھادوں کا استعمال

کھاد 2.5 سینٹی میٹر گہری، جڑوں کے قریب ڈالیں



درجہ بالا دی گئی خوراک فصل کی متوازن خوراک کی ضرورت اور 20,500 فی ایکڑ پودوں کے مطابق ہے - موسم، زمین کی صورتحال اور پودے کی نشوونما کے مطابق خوراک کی مقدار ایڈجسٹ کر لیں۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام

- کیڑے مکوڑوں کی نگرانی اور بڑے پیمانے پر پکڑنے کے لیے چپکنے والی شیٹ کا استعمال کریں۔



ایک ہی زمین میں مختلف فصلوں کی گردش کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بحال کرتی ہے۔



بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیمار پودوں، پرانی فصلوں اور جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر تلف کر دینا چاہیے۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام اور کیڑے مار ادویات کا محفوظ استعمال

- کیڑوں میں مدافعت سے بچاؤ کے لئے متبادل طریقہ
- ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیبل اور مطلوبہ استعمال (رجسٹرڈ فصل اور کیڑے) کو پڑھیں



کیڑوں کی اقسام

ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	سست تیلہ	کیٹر پلر
لیمڈا - سائلوٹرن (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓
ڈینوٹیفورون (Dinotefuran)	4A	S	✓	
سپائنوساڈ (Spinosad)	5	S		✓
سپائنٹورم (spinetoram)	5	SC		✓
ایبامیکٹن (Abamectin)	6	SC (slight S)		✓
تھیوسائیکلیم آکسالیٹ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	
کلورنٹرانلیپرول (Chlorantraniliprole)	28	S		✓
فلوبنڈی امائیڈ (Flubendiamide)	28	S		✓
بٹسلس تھرنجنسینس (Bacillus thuringiensis)	11A	C		✓
آزادیراکٹن (Azadirachtin)	UN	unknown	✓	✓

IRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: S (سرائیٹ پزیری); SC (نظام ہضم + لمسی اثر)



بیماریوں کی اقسام

ایکٹو اجزاء	زہر پزیری کا طریقہ	عمل	ریمارکس	رسٹ	کارن لیف بلاٹ	ڈاؤنی مائلڈیو
(Copper) پر مبنی پھپھوندی کش ادویات	M 01	P		✓	✓	✓
کلوروٹھالونیل (Chlorothalonil)	M 05	P		✓	✓	✓
مینکوزیب (Mancozeb)	M 03	P		✓	✓	✓
آزوکسیسٹروبین (Azoxystrobin)	11	P + C	ایک فصل کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 دفع	✓	✓	✓
پروپاموکارب (Propamocarb)	28	P + C			✓	✓
سائیموکسنل (Cymoxanil)	27	C	ٹینک میں حفاظتی کیمیکل ڈالیں (کلوروٹھالونیل اور مینکو زیب)			✓
میٹالاکسل (Metalaxyl)	4	P + C	مدافعت کا زیادہ خطرہ (اس لئے سیزن میں 2 دفع استعمال کریں)			✓
بیسیلیس سبٹیلس (Bacillus subtilis)	BM02	P			✓	✓

FRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: P = حفاظتی (صرف اس صورت میں مؤثر ہے جب بیماری کی علامات ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں); C = معالجاتی



4

سپرے کے بعد ہاتھ دھوئیں



3

اچھی نوزل کا استعمال کریں



2

اچھے موسم کا انتخاب کریں



1

حفاظتی پوشاک پہنیں



KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

کاپی رائٹ © 2021 از ایسٹ ویسٹ سیڈ فاؤنڈیشن۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔
ایگرو کیمیکل سفارشات ویگننگن یونیورسٹی اینڈ ریسرچ کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں۔