




URDU



# رہنمائی کتابچہ قلمی ساگ

## • زمین کی تیاری

- تنگ کھالا اچھی آبپاشی اور نکاسی کے لئے مفید ہے
- 180,000 سے 550,000 پودے فی ایکڑ (ورائیٹی اور موسم کی مناسبت سے ایڈجسٹ کریں)



## • بیجائی




- چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے قطاریں اور پودے لگانے کا فاصلہ بنائیں
- قریب قریب بیج بوئیں
- پتلا کریں، جب ضرورت ہو تو

## • کھادوں کا استعمال

کھاد 2.5 سینٹی میٹر گہری، جڑوں کے قریب ڈالیں  
کھاد ڈالنے سے پہلے جڑی بوٹیوں کو ہٹا دیں۔

50 گرام

100 گرام



درجہ ذیل بالا دی گئی خوراک 180,000 سے 550,000 فی ایکڑ پودوں کے مطابق ہے۔  
موسم، زمین کی صورتحال اور پودے کی نشوونما کے مطابق خوراک کی مقدار ایڈجسٹ کر لیں۔

## • کیڑوں کا مربوط انتظام



- کیڑے مکوڑوں کی نگرانی اور بڑے پیمانے پر پکڑنے کے لیے چپکنے والی شیٹ کا استعمال کریں۔



ایک ہی زمین میں مختلف فصلوں کی گردش کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بحال کرتی ہے۔



بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیمار پودوں، پرانی فصلوں اور جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر تلف کر دینا چاہیے۔

# • کیڑوں کا مربوط انتظام اور کیڑے مار ادویات کا محفوظ استعمال

- کیڑوں میں مدافعت سے بچاؤ کے لئے متبادل طریقہ
- پتوں والی سبزیوں کے لیے کیڑے مار ادویات کے استعمال سے گریز کریں۔ اگر ضروری ہو تو فصل کی کٹائی سے ایک ہفتہ قبل سپرے کم کر دیں۔
- ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیبل اور مطلوبہ استعمال (رجسٹرڈ فصل اور کیڑے) کو پڑھیں



| ایکٹو اجزاء                                | زہر پزیری کا طریقہ | عمل           | کیٹرپلر | فلی بیٹل | لیف مائنر |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|----------|-----------|
| لیمڈا - سائلوٹرن (Lambda-cyhalothrin)      | 3A                 | SC            | ✓       | ✓        | ✓         |
| ڈینوٹیفورون (Dinotefuran)                  | 4A                 | S             | ✓       | ✓        | ✓         |
| سپائنوساڈ (Spinosad)                       | 5                  | S             | ✓       | ✓        | ✓         |
| سپائینٹورم (spinetoram)                    | 5                  | SC            | ✓       | ✓        | ✓         |
| ایبامیکٹن (Abamectin)                      | 6                  | SC (slight S) | ✓       | ✓        | ✓         |
| تھیوسائیکلکلم آکسالیٹ (Thiocyclam oxalate) | 14                 | SC            | ✓       | ✓        | ✓         |
| کلورنٹرانلیپرول (Chlorantraniliprole)      | 28                 | S             | ✓       | ✓        | ✓         |
| فلوبنڈی امائیڈ (Flubendiamide)             | 28                 | S             | ✓       | ✓        | ✓         |
| بٹسلس تھرنجنسنس (Bacillus thuringiensis)   | 11A                | C             | ✓       | ✓        | ✓         |
| آزادیراکٹن (Azadirachtin) (نیم کا عرق)     | UN                 | unknown       | ✓       | ✓        | ✓         |

IRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: S (سرائیٹ پزیری); SC (نظام بضم + لمسی اثر)



| ایکٹو اجزاء                         | زہر پزیری کا طریقہ | عمل   | ریمارکس                               | سفید رسٹ |
|-------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----------|
| (Copper) پر مبنی پھپھوندی کش ادویات | M 01               | P     |                                       | ✓        |
| کلوروٹھالونیل (Chlorothalonil)      | M 05               | P     |                                       | ✓        |
| مینکوژیپ (Mancozeb)                 | M 03               | P     |                                       | ✓        |
| آزوکسیسٹروبین (Azoxystrobin)        | 11                 | P + C | ایک فصل کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 دفع | ✓        |

FRAC کی بنیاد پر زہر پزیری کا طریقہ: P = حفاظتی (صرف اس صورت میں مؤثر ہے جب بیماری کی علامات ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں); C = معالجاتی



4 سپرے کے بعد ہاتھ دھوئیں



3 اچھی نوزل کا استعمال کریں



2 اچھے موسم کا انتخاب کریں



1 حفاظتی پوشاک پہنیں



# KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

کاپی رائٹ © 2021 از ایسٹ ویسٹ سیڈ فاؤنڈیشن۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔  
ایگرو کیمیکل سفارشات ویگننگن یونیورسٹی اینڈ ریسرچ کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں۔