



URDU

رہنمائی کتابچہ چائینیز بند گوبھی • زمین کی تیاری

- تنگ کھالا اچھی آبپاشی اور نکاسی کے لئے مفید ہے
- مٹی کی مٹی کو محفوظ رکھنے اور جڑی بوٹیوں کی بڑھوتری کو کم کرنے کے لیے نامیاتی یا پلاسٹک کی ملچ لگائی جا سکتی ہے۔
- 16,000-12,000 پودے فی ایکڑ (وراثتی اور موسم کی مناسبت سے ایڈجسٹ کریں)





• پنیری کی تیار


◆ ٹرے کے لیے مٹی کی تیاری: درج ذیل مکسچر کو 10 منٹ تک اچھی طرح گرم کریں یا آدھا دن بھر پور سورج کی روشنی میں رکھیں اور ٹھنڈا کر کے ٹرے میں بھر لیں




◆ بیج لگائیں اور پنیری کو محفوظ رکھیں




◆ وتر ہر وقت برقرار رکھیں



◆ پنیری کو منتقلی سے 5-7 دن پہلے پانی کم کر دیں اور سورج کی روشنی میں رکھیں اور پنیری کو شام میں منتقل کریں



• کھادوں کا استعمال



درجہ ذیل بالا دی گئی خوراک 12,000-16,000 فی ایکڑ پودوں کے مطابق ہے۔
موسم، زمین کی صورتحال اور پودے کی نشوونما کے مطابق خوراک کی مقدار ایڈجسٹ کر لیں۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام



- کیڑے مکوڑوں کی نگرانی اور بڑے پیمانے پر پکڑنے کے لیے چپکنے والی شیٹ کا استعمال کریں۔
- فروٹ فلائی کے لیے سویٹ ٹریپ، تلسی کا عرق یا فیرومون ٹریپ استعمال کریں۔



ایک ہی زمین میں مختلف فصلوں کی گردش کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہے اور زمین کی زرخیزی کو بحال کرتی ہے۔



بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیمار پودوں، پرانی فصلوں اور جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر تلف کر دینا چاہیے۔

• کیڑوں کا مربوط انتظام اور کیڑے مار ادویات کا محفوظ استعمال

- کیڑوں میں مدافعت سے بچاؤ کے لئے متبادل طریقہ
- ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیبل اور مطلوبہ استعمال (رجسٹرڈ فصل اور کیڑے) کو پڑھیں



ایکٹو اجزاء	زیر پزیری کا طریقہ	عمل	سفید مکھی	سست تیلہ	کیٹرپلر	ڈائمنڈ بیک موتھ	فلی بیٹل (Flea Beetle)
لیمڈا - سائلوٹرن (Lambda-cyhalothrin)	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ڈینوٹیفورون (Dinotefuran)	4A	S	✓	✓	✓	✓	✓
سپائوساڈ (Spinosad)	5	S	✓	✓	✓	✓	✓
سپائینٹورم (spinetoram)	5	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ایبامیکٹن (Abamectin)	6	SC (slight S)	✓	✓	✓	✓	✓
تھیوسائیکلککلم آکسالیٹ (Thiocyclam oxalate)	14	SC	✓	✓	✓	✓	✓
کلورنٹرانلیپرول (Chlorantraniliprole)	28	S	✓	✓	✓	✓	✓
فلوبنڈی امانڈ (Flubendiamide)	28	S	✓	✓	✓	✓	✓
بٹلسس تھرنجنسنس (Bacillus thuringiensis)	11A	C	✓	✓	✓	✓	✓
آزادیراکٹن (Azadirachtin) (نیم کا عرق)	UN	unknown	✓	✓	✓	✓	✓



ایکٹو اجزاء	زیر پزیری کا طریقہ	عمل	ریمارکس	بلیک راٹ	بیکٹیریل سافٹ راٹ	متبادل لیف سپاٹ	ڈاؤنی مائلڈیو
Copper (Copper) پر مبنی پھپھوندی کش ادویات	M 01	P	بیکٹیریل بیماریوں کے لیے: صرف اس وقت استعمال کریں جب ضروری ہو! ممکنہ مزاحمت سے بچنے کے لیے زیادہ استعمال نہ کریں	✓	✓	✓	✓
Chlorothalonil (کلوروٹھالونیل)	M 05	P		✓	✓	✓	✓
Mancozeb (مینکوزیب)	M 03	P		✓	✓	✓	✓
Azoxystrobin (آزوکسیسٹروبین)	11	P + C	ایک فصل کے دوران زیادہ سے زیادہ 4 دفع	✓	✓	✓	✓
Propamocarb (پروپاموکارب)	28	P + C		✓	✓	✓	✓
Cymoxanil (سائیموکسانیل)	27	C	لینک میں حفاظتی کیمیکل ڈالیں (کلوروٹھالونیل اور مینکو زیب)	✓	✓	✓	✓
Metalaxyl (میٹالاکسل)	4	P + C	مدافعت کا زیادہ خطرہ (اس لئے سیزن میں 2 دفع استعمال کریں)	✓	✓	✓	✓
Bacillus subtilis (بیسیلیس سبٹیلس)	BM02	P		✓	✓	✓	✓



<https://growhow.eastwestseed.com>

کاپی رائٹ © 2021 از ایسٹ ویسٹ سیڈ فاؤنڈیشن۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔
ایگرو کیمیکل سفارشات ویگنگن یونیورسٹی اینڈ ریسرچ کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں۔