



# คู่มือการปลูก ต้ากวางตุ้ง

## • การเตรียมแปลง

- » ร่องน้ำช่วยในเรื่องการให้น้ำและระบายน้ำ
- » การคลุมแปลงด้วยพลาสติกหรือวัสดุธรรมชาติสามารถช่วยในการรักษาความชื้นในดินและลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลงได้
- » 35,550 ตัน/ไร่ (สามารถปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์และฤดูกาลได้)



ภาษาไทย



## • การหยดเมล็ดโดยตรง


» สร้างแกรบลูกและระยะปลูก (โดยใช้ไม้ในการขีดลาก)

» โภยเมล็ดบาง ๆ


» ถอนแยก:

- ห่าง 10 เซนติเมตร สำหรับต้นอ่อน
- ห่าง 20 เซนติเมตร สำหรับต้นที่กำลังเติบโต
- ห่าง 25 - 30 สำหรับต้นที่เติบโตแล้ว

» ต้นที่ทำการถอนแยกแล้ว สามารถนำไปจำหน่าย หรือนำมารับประทานได้



## • การใส่ปุ๋ย



ปริมาณปุ๋ยที่แนะนำดังกล่าว คำนวณตามปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับประชากรพืช 35,550 ตันต่อไร่ สามารถปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล, สภาพดิน และระยะเวลาเจริญเติบโตของพืช

## • การจัดการศัตรูพืชแบบสมดسان



» สามารถใช้กับคอกาวเหนียวเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูพืชในแปลงได้

» กำจัดและทำลายเชื้อจากพืชที่ติดโรค, เศษชาดพืชและวัชพืช เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในแปลง



กำจัดและทำลายเชื้อจากพืชที่ติดโรค,  
เศษชาดพืชและวัชพืช เพื่อป้องกัน  
การแพร่กระจายของเชื้อโรคในแปลง



ปลูกพืชหมุนเวียน  
เพื่อป้องกันการสะสมของแมลงพาหะ,  
เชื้อโรคพืช และคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

## • การจัดการศัตรูพืชแบบสมดسانและการใช้สารกำจัดศัตรูอย่างปลอดภัย

- » สรับกุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการคื้อยา
- » หลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชสำหรับผักใบ หากมีความจำเป็นควรเร้นการฉีดพ่น 1 สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยว
- » อ่านฉลากสารกำจัดแมลงและวัตถุประสงค์การใช้งานเสมอ (ใช้งานตามพืชและศัตรูพืชที่ระบุในฉลาก)



สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤทธิ์	การออกฤทธิ์	เพลี้ยอ่อน	หนอนผีเสื้อ	หนอนไข้ผัก	ตัวงหมักผัก
แอลมิค้า ไซชาโลทริน	3A	SC	✓	✓	✓	✓
ໄโคโนทິພູແຮນ	4A	S	✓		✓	✓
ສປິນໂພແຊດ	5	S		✓	✓	✓
ສປິນໂໂກແຮນ	5	SC		✓	✓	
ອະບານັກຕິດິນ	6	SC (ຄຸກສົມເລັກນ້ອຍ)		✓	✓	✓
ໄທໂວໃຊແຄມ ອອກຫາເລັດ	14	SC	✓			
ຄລອແຣນທຣານີລີໂພຣລ	28	S		✓	✓	
ຟຸລູເບັນໄຂອະນຸມັກ	28	S		✓	✓	
ບາສິລັສ ຫຼຸງຍົນເຊີສ	11A	C		✓	✓	
ສາຮກັກສະເກາ	UN	ໄມ່ຈະນຸ	✓	✓	✓	✓

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก IRAC; SC (ประเกทกິນຕາຍ+ສົນຜົກ); S (ประເທດຄຸກສົມ)



สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤதิ์	การออกฤทธิ์	หมายเหตุ	ใบຖຸກາ	ရານໍ້ຄ້າງ
ສາຮປັບປຸງກັນກຳຈັກເຊົາທີ່ມີສາຮປະກອບທອງແຄງ	M 01	P		✓	✓
ຄລອໂຣກາໂນິລ	M 05	P		✓	✓
ແມນໂຄເສນ	M 03	P		✓	✓
ອະເຊື້ອກສີສໂຄຣບິນ	11	P + C	ສູງສຸດ 4 ຄຽ້ງທ່ອງກາບປຸກ	✓	✓
ໂພພາໂມຄົກ	28	P + C			✓
ໄຊນອກຫານິລ	27	C	ສາຮທີ່ອຳຈຸດທີ່ປັບປຸງກັນສາກາດແສມກັນໄດ້ (ຄອງໃຫ້ໃນິລ ທີ່ອີ້ນ ແມ່ນໂຄເສນ)		✓
ມາຫາແກເຊີຄ	4	P + C	ຈ່າຍທ່ອກກຳຕົ້ນຢາ (ໃຫ້ເພີ້ນ 2 ຄຽ້ງທ່ອງກາບປຸກ)		✓
ບາສິລັສ ຂັບທິລີສ	BM02	P			✓

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก FRAC; P=ການປັບປຸງກັນ (ມີປະສິດທິພາພເມື່ອໄຣກພື້ນບໍ່ປ່າກູງ), C=ການຈັກຢາ

- ① สวมชุดป้องกันถูกต้อง
- ② อากาศที่เหมาะสมต่อการฉีด
- ③ หัวฉีดคีดีและสะอาด
- ④ ทำความสะอาดหลังการฉีดพ่น



# KNOWLEDGE TRANSFER

<https://growhow.eastwestseed.com>

คู่มือการปลูกจนบันนี้เป็นผลิตขึ้นโดย มูลนิธิอีสท์ เวสท์ ชีค @ 2021 ศิษย์เก่าของมูลนิธิอีสท์ เวสท์ ชีค ขอสงวนลิขสิทธิ์  
คำแนะนำค้านเคมีเกษตรได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับ Wageningen University & Research