




คู่มือการปลูก พริกหยวก

• การเตรียมแปลง

- » ร่องน้ำช่วยในเรื่องการให้น้ำและระบายน้ำ
- » การคลุมแปลงด้วยพลาสติกหรือวัสดุธรรมชาติสามารถช่วยในการรักษาความชื้นในดินและลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลงได้
- » ปักค้ำหลังย้ายปลูก 8-10 วัน
- » 4,260 ต้น/ไร่ (สามารถปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์และฤดูกาลได้)



ภาษาไทย



• การเพาะกล้า

- ♦ การเตรียมดินเพาะ : ให้ความร้อน 10 นาที หรือ ตากแดดจัดประมาณครึ่งวัน แล้วนำไปใส่ในถาดเพาะ



ดิน 1-2 ส่วน



ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายดีแล้ว 1 ส่วน




ทรายหรือแกลบคั่ว 1 ส่วน



- ♦ การเพาะเมล็ดและการดูแลต้นกล้า




หยอดลึกประมาณ 2 เท่าของขนาดเมล็ด



ระบายอากาศดี

- ♦ รักษาความชื้นให้ต่อเนื่อง



ตอนเช้า





ตอนเย็น




25-28 วัน

ละลายแคลเซียมไนเตรต 10-15 กรัม
กับน้ำ 10 ลิตร รดต้นกล้าอายุ 10 วัน
หลังงอก (หากจำเป็น)

- ♦ ลดการให้น้ำลง และให้ต้นกล้าได้รับแสงมากขึ้น 2-3 วัน ก่อนการย้ายปลูกลงในช่องเย็น



• การใส่ปุ๋ย




ปริมาณปุ๋ยที่แนะนำดังกล่าว คำนวณตามปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับประชากรพืช 4,260 ต้นต่อไร่
สามารถปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล, สภาพดิน และระยะการเจริญเติบโตของพืช

• การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน



» สามารถใช้กับดักกาวเหนียวเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูพืชในแปลงได้



กำจัดและทำลายเชื้อจากพืชที่ติดโรค,
เศษซากพืชและวัชพืช เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคในแปลง



ปลูกพืชหมุนเวียน
เพื่อป้องกันการสะสมของแมลงพาหะ,
เชื้อโรคพืช และดินความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

• การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้สารกำจัดศัตรูอย่างปลอดภัย

- » สลับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยา
- » อ่านฉลากสารกำจัดแมลงและวัตถุประสงค์การใช้งานเสมอ (ใช้งานตามพืชและศัตรูพืชที่ระบุในฉลาก)



สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤทธิ์	การออกฤทธิ์	เพลี้ยไฟ	แมลงหวี่ขาว	เพลี้ยอ่อน	ไรแดง	หนอนผีเสื้อ
แลมบ์ดา ซิฮาโลทริน	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ไดโนทีฟูแรน	4A	S	✓	✓	✓		
สปิโนแซค	5	S					✓
สไปนีโทแรม	5	SC					✓
อะบาเม็กติน	6	SC (ดูดซึมเล็กน้อย)	✓			✓	✓
ไทโอไซแคลม ออกซาลิฟอส	14	SC	✓	✓	✓		
คลอแรนทรานิลโพรล	28	S					✓
ฟลูเบนโคไซด์	28	S					✓
บาซิลลัส ทุริงเยนซิส	11A	C					✓
สารสกัดสะเดา	UN	ไม่ระบุ	✓	✓	✓	✓	✓

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก IRAC; SC (ประเภทกินตาย+สัมผัส); S (ประเภทดูดซึม)



สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤทธิ์	การออกฤทธิ์	หมายเหตุ	แอนแทรคโนส	ใบจุดเชอคอสพอรา	ราแป้ง	ใบจุดแบคทีเรีย	โรคเหี่ยวเหี่ยว	ไวรัส
สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีสารประกอบทองแดง	M 01	P	สำหรับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	✓	✓	✓	✓	✓	
คลอโรทาโรนิล	M 05	P		✓	✓	✓	✓		
แมนโคเซบ	M 03	P		✓	✓	✓	✓		
อะซ็อกซิสโตรบิน	11	P + C	สูงสุด 4 ครั้งต่อรอบการปลูก	✓	✓	✓	✓		
บาซิลลัส ซับทิลิส	BM02	P		✓	✓	✓	✓	✓	
									ใช้สายพันธุ์ต้านทานหรือต้นกล้าที่ปราศจากโรค

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก FRAC; P=การป้องกัน (มีประสิทธิภาพเมื่อโรคพืชยังไม่ปรากฏ), C=การรักษา

- 

สวมชุดป้องกันถูกต้อง
- 

อากาศที่เหมาะสมต่อการฉีด
- 

หัวฉีดดีและสะอาด
- 

ทำความสะอาดหลังการฉีดพ่น

<https://growhow.eastwestseed.com>

คู่มือการปลูกฉบับนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ มูลนิธิอีสท์ เวสต์ ซีด © 2021 ลิขสิทธิ์ของมูลนิธิอีสท์ เวสต์ ซีด ขอสงวนลิขสิทธิ์
คำแนะนำด้านเคมีเกษตรได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับ Wageningen University & Research