




คู่มือการปลูก กะหล่ำปลี

• การเตรียมแปลง

- » ร่องน้ำช่วยในเรื่องการให้น้ำและระบายน้ำ
- » การคลุมแปลงด้วยพลาสติกหรือวัสดุธรรมชาติสามารถช่วยในการรักษาความชื้นในดินและลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลงได้
- » 4,260 ต้น/ไร่ (สามารถปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์และฤดูกาลได้)



ภาษาไทย



• การเพาะกล้า

- ♦ การเตรียมดินเพาะ : ให้ความร้อน 10 นาที หรือ ตากแดดจัดประมาณครึ่งวัน แล้วนำไปใส่ในถาดเพาะ




- ♦ การเพาะเมล็ดและการดูแลต้นกล้า




- ♦ รักษาความชื้นให้ต่อเนื่อง



- ♦ ลดการให้น้ำลง และให้ต้นกล้าได้รับแสงมากขึ้น 2-3 วัน ก่อนการย้ายปลูกในช่วงเย็น



• การใส่ปุ๋ย



ปริมาณปุ๋ยที่แนะนำดังกล่าว คำนวณตามปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับประชากรพืช 4,260 ต้นต่อไร่
สามารถปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล, สภาพดิน และระยะการเจริญเติบโตของพืช

• การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน



- » สามารถใช้กับดักกาวเหนียวเพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูพืชในแปลงได้
- » กำจัดและทำลายเชื้อจากพืชที่ติดโรค, เศษซากพืชและวัชพืช เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในแปลง



กำจัดและทำลายเชื้อจากพืชที่ติดโรค,
เศษซากพืชและวัชพืช เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคในแปลง



ปลูกพืชหมุนเวียน
เพื่อป้องกันการสะสมของแมลงพาหะ,
เชื้อโรคพืช และดินความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน

• การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้สารกำจัดศัตรูอย่างปลอดภัย

» สลับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยา

» อ่านฉลากสารกำจัดแมลงและวัตถุประสงค์การใช้งานเสมอ (ใช้งานตามพืชและศัตรูพืชที่ระบุในฉลาก)



สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤทธิ์	การออกฤทธิ์	แมลงหมีขาว	เพลี้ยอ่อน	หนอนผีเสื้อ	หนอนใยผัก	ด้วงหมัดผัก
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน	3A	SC	✓	✓	✓	✓	✓
ไดโนทีฟูแรน	4A	S	✓	✓			✓
สปิโนแซด	5	S			✓	✓	✓
สไปนีโทแรม	5	SC			✓	✓	
อะบาเม็กติน	6	SC (ดูดซึมเล็กน้อย)			✓	✓	✓
ไทโอไซแคลม ออกซาลิฟอส	14	SC	✓	✓			
คลอแรนทรานิลโพรล	28	S			✓	✓	
ฟลูเบนไดอะไมด์	28	S			✓	✓	
บาซิลลัส ทรูริงเยนซิส	11A	C			✓	✓	
สารสกัดสะเดา	UN	ไม่ระบุ	✓	✓	✓	✓	✓

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก IRAC; SC (ประเภทกินตาย+สัมผัส); S (ประเภทดูดซึม)



สารออกฤทธิ์	กลไกการออกฤทธิ์	การออกฤทธิ์	หมายเหตุ	เน่าดำ	ใบจุดแบคทีเรีย	ใบจุดรา	ราสีน้ำตาล
สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีสารประกอบทองแดง	M 01	P	สำหรับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	✓	✓	✓	✓
คลอโรไทราโซล	M 05	P		การพ่นสารป้องกันกำจัดไม่เกิดประสิทธิภาพในการรักษาได้ สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการอื่น เช่น การปลูกพืชหมุนเวียนและการกำจัดวัชพืชอย่างถูกวิธี เป็นต้น หลีกเลี่ยงการให้น้ำระบบสปริงเกลอร์		✓	✓
แมนโคเซบ	M 03	P				✓	✓
อะซ็อกซิสโตรบิน	11	P + C	สูงสุด 4 ครั้งต่อรอบการปลูก			✓	✓
โพพาไมคาร์บ	28	P + C					✓
ไซมอกซานิล	27	C	สารที่ออกฤทธิ์ป้องกันสามารถผสมกันได้ (คลอโรไทราโซล หรือ แมนโคเซบ)				✓
เมทาแลกซิล	4	P + C	ง่ายต่อการดื้อยา (ใช้เพียง 2 ครั้งต่อรอบการปลูก)				✓
บาซิลลัส ซับทิลิส	BM02	P		✓	✓		✓

กลไกการออกฤทธิ์ อ้างอิงจาก FRAC; P=การป้องกัน (มีประสิทธิภาพเมื่อโรคพืชยังไม่ปรากฏ), C=การรักษา

- สวมชุดป้องกันถูกต้อง
- อากาศที่เหมาะสมต่อการฉีด
- หัวฉีดดีและสะอาด
- ทำความสะอาดหลังการฉีดพ่น

<https://growhow.eastwestseed.com>

คู่มือการปลูกฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ มูลนิธิอีสท์ เวสต์ ซีด © 2021 ลิขสิทธิ์ของมูลนิธิอีสท์ เวสต์ ซีด ขอสงวนลิขสิทธิ์
คำแนะนำด้านเคมีเกษตรได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับ Wageningen University & Research